

26. 根状茎短；小穗通常 3—4 个，雄小穗长 0.5 厘米，低于邻近的雌小穗；果囊倒卵状椭圆形或椭圆形，长 5—6 毫米，顶端骤缩成短喙。……………

…………… 145. 隐穗薹草 *C. infossa* C. P. Wang

119. 羊须草 图版 37: 1—4

*Carex callitrichos* V. Krecz. in Kom., Fl. USSR, 3: 619 et 364, 1935; Kitagawa, Lineam. Fl. Mansh. 93, 1939; 东北植物检索表 534, 图版 196, 图 2, 1969; 东北草本植物志 11: 119, 图版 54, 图 6—10, 1976. —*Carex humilis* Leyss. var. *callitrichos* (V. Krecz.) Ohwi, Cyper. Japon. 1: 399, 1936, in descr.; Akiyama, Caric. Far East. Reg. Asia 232, pl. 238, fig. 2, F. 1955. —*Carex humilis* Leyss. forma *callitrichos* (V. Krecz.) T. Koyama in Journ. Fac. Sci. Univ. Tokyo, III, 8: 175, 1962.

119a. 羊须草 (原变种)

var. *callitrichos*


根状茎长，匍匐或斜生。秆疏丛生，高 2—6 厘米，纤细如发，钝三棱形，光滑，基部具红褐色的宿存叶鞘。叶长为秆的 5—6 倍，细如毛发状，柔软，宽 0.2—0.8(1) 毫米，无毛，极少疏被短柔毛。苞片佛焰苞状，长 7—10 毫米，光滑，顶端急尖，鞘口边缘膜质，无明显之苞叶。小穗 2—4 个，疏远；顶生的 1 个雄性，圆柱形，长 5—8 毫米，粗约 1—1.5 毫米，具少数花；侧生的 1—3 个为雌小穗，线形，长 5—7 毫米；小穗柄短，通常不伸出苞鞘外，小穗轴曲折，花少数，1—3 朵，疏生。雄花鳞片披针形，顶端急尖，长约 2.5 毫米，淡锈色，边缘白色膜质；雌花鳞片披针形，长 3—4 毫米，顶端渐尖或急尖，具短尖，中间绿色，具 1 条中脉，两侧锈色或淡锈色，具宽的白色膜质边缘。果囊短于鳞片，倒卵形，钝三棱形，长 2.5—3 毫米，淡绿色，被短柔毛，具明显的 2 侧脉及不明显的细脉，基部骤缩成微内弯的短柄，顶端圆，骤缩成极短的喙，喙口微凹或全缘，通常为淡褐色。小坚果长圆状倒卵形，三棱形，长约 2.3—2.5 毫米，成熟时褐色，基部收缩成短柄，顶端圆，具短喙；花柱基部稍增粗，柱头 3 个。

产于黑龙江省；生于红松林下，海拔 800—1 000 米。俄罗斯（远东）、朝鲜、日本也有分布。模式标本采自俄罗斯远东地区。

茎叶可造纸、搓绳及包装填充之用。

119b. 矮丛薹草 (变种) (东北植物检索表)

var. *nana* (Lévl. et Vant.) Ohwi, Cyper Japon. 1: 399, 1936, in descr. et Fl. Jap. 201, 1953; Akiyama, Caric. Far East. Reg. Asia 232, 1955; 东北草本植物志 11: 121, 图版 54, 图 1—5, 1976; 中国高等植物图鉴 5: 307, 图 7443, 1976; 江苏植物志上册: 310, 1977; 内蒙古植物志 8: 99, 图版 42, 图 1—5, 1985; 北京植物志下册: 1309, 图 1576, 1987; 河北植物志 3: 426, 图 2079, 1991——*Carex lanceolata*



图版 37 1—4. 羊须草 *Carex callitrichos* V. Krecz: 1. 植株, 2. 雌花鳞片, 3. 果囊, 4. 小坚果; 5—8. 假矮薹草 *C. pseudohumilis* Wang et Y. L. Chang ex P. C. Li: 5. 植株, 6. 雌花鳞片, 7. 果囊, 8. 小坚果。(吴彰桦绘)