

5—6 毫米，具 2—3 朵疏生的花；小穗柄甚纤细，微伸出苞鞘外。雄花鳞片披针形，长约 4.5 毫米，顶端渐尖，纸质，淡褐色，具狭的白色膜质边缘，有 1 条中脉；雌花鳞片近卵形，长 2.4—2.6 毫米，顶端渐尖，有短尖，纸质，褐色，具宽的白色膜质边缘，有 1 条中脉。果囊长于鳞片，宽卵球形，肿胀三棱形，长 3.5—3.6 毫米，绿褐色，密被短粗毛，具 2 侧脉和多条纵脉，基部骤缩成短柄，顶端收缩成中等长的喙，喙口膜质，具 2 小齿。小坚果宽倒卵形，三棱形，长约 1.8 毫米，成熟时棕褐色；花柱基部膨大，柱头 3 个。

产于四川西南部、云南西北部、西藏东部；生于山坡湿润草地、灌丛下、云南松林下，海拔 2 200—3 500 米。模式标本采自云南丽江玉龙山。

145. 隐匿薹草

Carex infossa C. P. Wang in Journ. of Nanjing Univ. 51, 1962; 江苏植物志上册: 311, 图 552, 1976.

145a. 隐匿薹草 (原变种)

var. *infossa*

根状茎短。秆高可达 30 厘米，纤细，三棱形，基部具无叶片或短叶片的鞘，鞘黑紫色，老叶鞘有时撕裂成纤维状。叶短于秆，宽 2.5—3 毫米，质软，两面或仅背面粗糙。苞片叶状，长于小穗，具短鞘。小穗 3—4 枚，顶生雄小穗与最上面的雌小穗间距短且低于雌小穗，下面的小穗较远离，雄小穗狭倒卵形或近线形，长约 5 毫米，具短柄；其余为雌小穗，长圆形，长 0.8—2 厘米，疏生 3—4 朵花，少数可有 5—6 朵花，具稍长的小穗柄。雄花鳞片在基部的呈管状，后期开裂，仅基部合生，长 4—4.5 毫米，顶端钝或微急尖，淡褐色或麦秆黄色，脊部绿色；雌花鳞片长圆形或长圆状卵形，长约 3.5 毫米，顶端具小短尖或短芒，膜质，苍白色，中间淡绿色，具 3 条脉。果囊近于直立，长于鳞片，椭圆形或倒卵状椭圆形，三棱形，长 5—6 毫米，灰绿色，具褐色斑点，被短柔毛，具两条明显的侧脉和多条不很明显的细脉，基部骤缩成短柄，顶端急缩成短喙，喙口具两短齿。小坚果宽椭圆形，三棱形，长约 3.5 毫米，基部具扭曲的柄，顶部下凹；花柱短，基部稍增粗，柱头 3 个。 花果期 4—6 月。

产于江苏、安徽；生于山坡、林下或沟边。模式标本产于安徽琅琊山。

145b. 显穗薹草 (变种)

var. *extensa* S. W. Su in Journ. of Anhui Univ. 20 (3): 108, 1996.

本变种与原变种的主要区别在于顶生雄小穗的小穗长，通常超过最上面 1 个雌小穗，最下面的雌小穗近秆基部生出。果囊顶端具较长的喙。 花果期 4—5 月。

产于安徽。模式标本采自安徽祁门查湾。