

米。模式标本采自云南镇康。

161. 百坡山薑草 (云南植物研究)

*Carex baiposhanensis* P. C. Li in Acta Bot. Yunn. 12 (2): 145, 图 12, 1990; 横断山区维管植物下册: 2369, 1994.

根状茎木质, 具匍匐茎。秆丛生, 高 40—50 厘米, 纤细, 基部具红棕色叶鞘。叶与秆近等长, 宽 5—7 毫米, 平张, 上部粗糙。苞片叶状, 长于花序, 具长鞘。小穗多数, 2—5 个聚成 1 簇, 共 5—6 簇, 远离, 上部 3—6 个雄性, 下部的雌性, 顶端具雄花, 线状圆柱形, 长 2—3.5 厘米, 疏花, 与柄近等长; 小穗柄纤细。雌花鳞片长圆形, 长 4.5—5 毫米, 血红色, 背面中部黄绿色, 具 3 条脉, 边缘为宽膜质, 顶端近圆形或微凹, 具短芒。果囊几乎长于鳞片, 膜质, 卵状菱形, 三棱形, 长 5—7 毫米, 绿色, 无毛, 脉不明显, 基部具短柄, 顶端渐狭成长喙, 边缘粗糙, 喙口具短 2 齿。小坚果椭圆形, 长 2.8—3 毫米, 棕色; 花柱基部增粗, 柱头 3 个, 极长。 花果期 7 月。

产四川 (米易); 生于云南松林下, 海拔 900 米。

模式标本采自四川米易。

162. 类霹雳薑草 (福建植物志)

*Carex subperakensis* L. K. Ling et Y. Z. Huang in Fl. Fujianica 6: 353, 1995.

根状茎短, 粗壮, 木质。秆高 50—70 厘米, 三棱形, 粗壮, 基部具褐色分裂成纤维状的老叶鞘。叶长于秆, 宽 7—11 毫米, 线形, 基部常对折, 背面具多数紫褐色的叶脉, 且粗糙。苞片下部的叶状, 长于花序, 具长鞘, 上部的短叶状或刚毛状、或鳞片状, 短于花序, 近无鞘。小穗多数, 几无小穗柄, 3—7 个集生成头状花序, 小穗雄雌顺序, 卵状圆柱形, 雄性部分约占小穗长的 1/4—1/3。雌花鳞片宽卵形, 长约 2.5 毫米, 常内卷成柄状, 中间淡绿色, 具 3 条脉, 两侧为白色透明膜质, 顶端锐尖或具短尖头。果囊长于鳞片, 卵状椭圆形, 扁三棱形, 长约 3 毫米, 膜质, 淡绿色, 密被白色短粗毛, 顶端渐狭成中等长的喙, 喙口具 2 尖齿。小坚果椭圆形, 扁三棱形, 长约 2 毫米, 淡褐色, 棱面微下凹, 基部具极短的柄; 花柱基部膨大, 粗糙, 柱头 3 个。 花果期 6—7 月。

产福建 (永安); 生于林下, 海拔约 900 米。模式标本采自福建永安。

本种与霹雳薑草 *C. perakensis* C. B. Clarke 相似, 但本种小穗几无柄, 密集呈头状花序, 且果囊卵状椭圆形等易于区别。

163. 霹雳薑草 (海南植物志) 黄穗薑 (台湾植物志)

*Carex perakensis* C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 6: 720, 1894; T. Koyama in Journ. Fac Sci. Univ. Tokyo Sect. III. 8 (4): 156, 1962; 海南植物志 4: 339, 1977; 台湾植物志 5: 314, 1978; 福建植物志 6: 353, 1995; ——*C. tonkinensis* Franch. in Nouv. Arch. Mus Paris III 8: 251, 1896; T. Koyama in Acta Phytotax.