

产于四川、云南；生于林下、溪边或路边，海拔2 100—2 600米。也分布于喜马拉雅山东部、锡金。

226b. 短叶亮绿藎草

var. *attenuata* C. B. Clarke in Hook. f., Fl. Brit. India 6: 736, 1894.

植株较矮小，高25—35厘米；叶较秆短得多；小穗通常较短，雄小穗长1—2.5厘米，雌小穗长2—4（—5）厘米；果囊较短，长约5毫米。

产于云南；生于水边草地或路边，海拔2 000—3 000米。也分布于印度。

227. 宝华山藎草 图版 56: 5—8

*Carex baohuashanica* Tang et Wang ex L. X. Dai in Acta Phytotax. Sin. 32 (2): 182—184, fig. 5, 5—8, 1994.

根状茎短，木质。秆丛生，高50—60厘米，较细，扁三棱形，平滑，基部具红棕色无叶片的鞘。叶短于秆，宽3—4毫米，平张，上端边缘粗糙，具鞘，基部的叶鞘常开裂，下面的叶鞘最长可达6厘米。苞片下面的叶状，上面的钻形，一般短于小穗，具苞鞘，鞘长1—3厘米。小穗3—4个，单生于苞片鞘内，小穗间距长，顶生小穗为雄小穗，长圆柱形，长约3厘米；侧生小穗为雌小穗，长1.8—3.5厘米，具4—6朵疏生的雌花，具纤细的小穗柄，最下面长达6.5厘米，上面的长1—2厘米。雄花鳞片长圆状披针形，长约5毫米，顶端急尖或钝，膜质，黄褐色，中间灰绿色，具1条中脉；雌花鳞片卵形，长约5毫米，顶端渐尖，膜质，白色半透明，有的稍带淡黄色，中间灰绿色，具1条中脉。果囊近于直立，长于鳞片，倒卵形，三棱形，长约7毫米，纸质，棕色，具多条脉，无毛，基部急狭成短柄，顶端急狭成长喙，喙口斜截形。小坚果为果囊所紧包，倒卵形，三棱形，长约3毫米，黄色，顶端具宿存的花柱基部，花柱不增粗；柱头3个。花果期3—4月。

产于江苏，生于山谷。模式标本采自江苏宝华山。

228. 卷柱头藎草 图版 55: 10—12

*Carex bostrychostigma* Maxim. in Mém. Biol. 12: 568, 1887; Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris 3 sér. 10: 58, 1897; Kom. Fl. Mansh. 1: 374, 1901; Kükenth. in Engl., Pflanzenr. Heft 38 (IV, 20): 593, 1909; V. Krecz. in Kom., Fl. URSS 3: 334, 1935; Ohwi, Cyper. Japon. 1: 444, 1936; 东北草本植物志 11: 92, 图版 40, 1976; 秦岭植物志 1 (1): 259, 1970. — *C. stenantha* C. B. Clarke in Journ. Linn. Soc. Bot. 36: 311, 1904, excl. syn., non Franch. et Savat.

根状茎长，木质，外被分裂成纤维状的黑褐色老叶鞘。秆密丛生，高20—50厘米，稍细弱，钝三棱形，平滑。叶短于秆或有的几与秆等长，宽3—4毫米，平张，上面两侧脉，背面中脉及边缘均粗糙，具鞘，鞘口下部常为干膜质。苞片下面的1—2个为叶状，上面的呈刚毛状，稍粗糙，具鞘。小穗5—8个，单生于苞片鞘内，顶生小穗为雄