

8. 果囊长2.5毫米。小坚果宽倒卵形，基部无柄 359. 箭叶藁草 *C. ensifolia* Turcz.

8. 果囊长4—4.5毫米。小坚果长圆形，基部具柄

..... 360. 山丹藁草 *C. shandanica* Y. C. Yang

1. 苞片基部的叶状。

9. 果囊短于鳞片，长圆形，长3毫米，宽1.2毫米。雌花鳞片长3.5—4毫米

..... 361. 中海藁草 *C. zhonghaiensis* S. Y. Liang

9. 果囊长于鳞片。

10. 果囊宽卵形或宽椭圆形，长2.5—3毫米。雌花鳞片长2.5毫米

..... 362. 木里藁草 *C. muliensis* Hand. -Mazz.

10. 果囊宽倒卵形或近圆形，长2—2.5毫米。雌花鳞片长1.5—1.7毫米

..... 363. 双辽藁草 *C. platysperma* Y. L. Chang et Y. L. Yang

353. 圆囊藁草 (中国高等植物图鉴) 图版83: 1—4

Carex orbicularis Boott in Proc. Linn. Soc. 1: 254, 1845 et in Trans. Linn. Soc. 20: 134, 1846; Kükenth. in Engl., Pflanzenr. Heft 38 (IV. 20): 303, 1909; V. Krecz. in Kom., Fl. URSS 3: 224, 1935; Poljak in Fl. Kazakh. 2: 57, 1958; egorova in Grubov. Pl. As. Centr. 3: 62, 1967 pro parte; 中国高等植物图鉴 5: 285, 图 7399, 1976; T. Koyama in Hara et al. Enum. Flow. Pl. Nepal 1: 104, 1978; 新疆植物检索表 341, 1982; 西藏植物志 5: 432, 图 252, 1987.


根状茎短，具匍匐茎。秆丛生，高10—25厘米，纤细，三棱形，粗糙，基部具栗色的老叶鞘。叶短于秆，宽1.5—3毫米，平张，边缘粗糙。苞片基部的刚毛状，短于花序，无鞘，上部的鳞片状。小穗2—3(4)个，顶生1个雄性，圆柱形，长1.2—2厘米，柄长3—9毫米；侧生小穗雌性，卵形或长圆形，长0.5—1.5厘米，花密生；最下部的具短柄，柄长2—3毫米，上部的无柄。雌花鳞片长圆形或长圆状披针形，顶端稍钝，长1.8—2.5毫米，宽1—1.2毫米，暗紫红色或红棕色，具白色膜质边缘，中脉色淡。果囊稍长于鳞片而较鳞片宽2—3倍，近圆形或倒卵状圆形，平凸状，长2—2.7毫米，宽2.3—2.5毫米，下部淡褐色，上部暗紫色，密生瘤状小突起，脉不明显，顶端具极短的喙，喙口微凹，疏生小刺。小坚果卵形，长约2毫米；花柱基部不膨大，柱头2个。 花果期7—8月。

产甘肃、青海、新疆、西藏，生于河漫滩或湖边盐生草甸，沼泽草甸，海拔2800—4600米。分布西亚和中亚地区、俄罗斯、印度西北部、巴基斯坦。

354. 藏北藁草 (西藏植物志)

Carex satakeana T. Koyama in Acta Phytotax. Geobot. 15: 113, 1954; 西藏植物志 5: 433, 1987.

根状茎短，近木质，无匍匐茎。秆高5—30厘米，纤细，锐三棱形，平滑，坚硬，直立，上部多少弯曲，基部叶鞘具叶或无叶片，褐色，分裂成纤维状。叶短于秆，宽



图版 83 1—4. 圆囊薹草 *Carex orbicularis* Boott. 1. 植株, 2. 雌花鳞片, 3. 果囊, 4. 小坚果; 5—8. 木里薹草 *C. multiensis* Hand.-Mazz.: 5. 花序, 6. 雌花鳞片, 7. 果囊, 8. 小坚果; 9—12. 蟋蟀薹草 *C. eleusinoides* Turcz.: 9. 花序, 10. 雌花鳞片, 11. 果囊, 12. 小坚果。(张泰利绘)