

363. 双辽藁草 (东北草本植物)

Carex platysperma Y. L. Chang et Y. L. Yang in Fl. Plant. Herb. Chin. Bor.-orient. **11**: 163, 206, 图版 74, 图 6—9, 1976.

363a. 双辽藁草 (原变种)

var. *platysperma*

根状茎短, 具长匍匐茎。秆高 40—50 厘米, 纤细, 平滑, 基部叶鞘无叶片, 褐色, 有光泽, 稍呈网状分裂。叶平张, 宽 2—2.5 毫米, 边缘粗糙。苞片叶状, 等长或稍长于花序, 无鞘。小穗 3—4 个, 顶生小穗雄性, 线形, 长 1—2.5 厘米; 其余小穗雌性, 稍接近, 圆柱形, 长 1—2 厘米, 花密生; 近无柄。雌花鳞片长圆状卵形, 顶端钝, 有时具短尖, 长 1.5—1.7 毫米, 紫红褐色, 背面淡绿色, 具 1 条脉。果囊长于鳞片, 宽倒卵形或近圆形, 平凸状, 具边, 长 2—2.5 毫米, 近膜质, 具 3—5 条脉, 基部具极短的柄, 顶端急缩成明显的短喙, 喙口凹缺成 2 齿。小坚果紧包于果囊中, 圆倒卵形, 近于双凸状, 长 1.5—1.7 毫米; 花柱基部不增粗, 柱头 2 个。

产吉林; 生于草原湿地。模式标本采自吉林双辽县郑家屯。

本种与陌上菅 *C. thunbergii* Steud. 相近, 不同在于本种果囊宽倒卵形或近圆形, 较小, 长 2—2.5 毫米。雌花鳞片亦较小。雌小穗近无柄等而不同。

363b. 松花江藁草 (变种)

var. *sungarensis* Y. L. Chang et Y. L. Yang in Fl. Plant. Herb. Bor.-orient. **11**: 165, 206, 1976.

与原变种不同在于果囊卵形或椭圆形, 顶端近无喙。

产黑龙江; 生于沼泽或湿地。模式标本采自黑龙江富锦。

以上两变种我们均未见到标本, 其描述系参考《东北草本植物志》(1976)。

亚组 3. 丛藁草亚组 Subsect 3. Caespitosae Fries ex Kükenth.

Fries (Summa veg. 226. 1845. nom. nud.) ex Kükenth. in Engl. Pflanzenr. Heft **38** (IV. 20): 324, 1909. —Subsect. *Vulgares* Aschers. Fl. Brandenb. 1: 774, 1864; Kükenth in Engl., Pflanzenr. Heft **38** (IV. 20): 305, 1909.

根状茎短或具匍匐茎。秆纤细, 锐三棱形, 基部具无叶片的叶鞘。叶平张或对折, 边缘反卷。苞片叶状或刚毛状。小穗上部的 1—2 (3) 个雄性, 其余的雌性, 圆柱形或长圆形, 花密生, 无柄或最下部的具短柄, 直立。雌花鳞片褐色或淡黑色, 背面具 3 脉, 顶端钝或锐尖。果囊卵形或椭圆形, 平凸状或双凸状, 膜质, 脉不明显或明显。

本亚组我国有 11 种 1 变种。

亚组模式种: 丛藁草 *C. caespitosa* L.