

Wahlenb., Tutin (1962) 把 *C. canescens* L. 作为混淆名称列于 *C. buxbaumii* Wahlenb. 之下作异名, Chater (1980) 在欧洲植物志中也没有采用 *C. canescens* L. 这一名称, 而是用 *C. curta* Good. 我们赞同 Tutin 和 Chater 的意见。

Egorova (1966) 采用 *C. canescens* L. 名称, 将 *C. cinerea* Poll. 作为该种的异名。崔乃然 (1982) 在新疆植物检索表中报导 *C. cinerea* Poll. 在阿尔泰山 (青河、大桥林场) 有分布, 由于我们没有看到该种的文献和标本, 附志于此, 留待核实。而且, 在新疆植物检索表中还报导布尔津产 *C. brunnescens* (Pers.) Poir., 该种与 *C. curta* Good. 十分接近, 仅果囊背面喙部有 1 条较长的裂缝。我们检查了产于布尔津附近的福海标本, 仍宜属于 *C. curta* Good., 但由于我们所见标本不多, 暂不作为错误鉴定, 也附志于此, 待今后进一步考证。

#### 487. 间穗薹草 (东北草本植物志) 图版 105: 9—12

*Carex loliacea* Linn. Sp. Pl. 974. 1753; Kom., Fl. Mansh. 1: 362, 1901; Kükenth. in Engl., Pflanzenr. Heft 38 (IV. 20): 225, 1909; Nakai, Fl. Kor. 2: 146, 1911; Mackenzie, North Amer. Fl. 18: 97, 1931; V. Krecz. in Kom., Fl. URSS 3: 173, t. 12, fig. 6, 1935; Ohwi, Cyper. Japon. 1: 271, 1936; Kitag., Lineam. Fl. Mansh. 105, 1939; Akiyama, Caric. Far East. Reg. Asia 62, pl. 29, 1955; Egorova, Caric. URSS Subgen. Vignea Sp. 192 fig. 23 (7), 1966; 东北草本植物志 11: 202, 图版 91, 图 1—6, 1976.

根状茎细而匍匐。秆疏丛生, 高 15—25 厘米, 纤细, 三棱形, 上部粗糙, 基部具淡褐色无叶片的叶鞘。叶短于秆, 宽 1—2 毫米, 平张, 边缘粗糙。苞片鳞片状。小穗 3—4 个, 半球形或卵形, 长 3—5 毫米, 宽 2—5 毫米, 头少花, 雌雄顺序; 穗状花序上部 2 个小穗接近, 下部远离。雌花鳞片宽卵形或卵形, 顶端稍钝, 长约 2 毫米, 苍白色, 中部绿色, 中脉明显或具不明显的 2 侧脉, 膜质。果囊长于鳞片, 长圆形或长圆状卵形, 平凸状, 长 2.5—3 毫米, 近革质, 淡绿褐色, 两面具多脉, 基部圆形, 具海绵状组织, 具短柄, 顶端近无喙, 喙口近全缘或微凹。小坚果紧包于果囊中, 宽椭圆形, 长约 1.5 毫米, 宽约 1.2 毫米, 顶端或基部近圆形; 花柱基部不膨大, 柱头 2 个。果期 5 月。

产黑龙江; 生于林下。分布欧洲 (西北部、俄罗斯北部至波兰及罗马尼亚)、亚洲 [俄罗斯 (西伯利亚、远东地区、中亚地区)、蒙古北部、朝鲜、日本 (北海道)] 和北美洲 (美国阿拉斯加、加拿大)。

我国东北的标本其果囊与日本的极相似, 但比欧洲的小。

#### 488. 细花薹草 (东北草本植物志)

*Carex tenuiflora* Wahlenb. in Vet. Akad. Nya Handl. Stockholm 24: 147, 1803; Kükenth. in Engl., Pflanzenr. Heft 38 (IV. 20): 224, fig. 36, D—F, 1909; V.

Krecz, in Kom., Fl. URSS **3**: 174, t. 12, fig. 7, 1935; Nakai, Fl. Kor, **2**: 307, 1911; Mackenzie, in North Amer. Fl. **18**: 86, 1931; Ohwi, Cyper. Japon **1**: 272, 1936; Kitag, Lineam. Fl. Mansh. **III**, 1939; Akiyama, Caric. Far East. Reg. Asia **62**, pl. 30, fig. 1, 1955; Egorova, Caric. URSS Subgen. *Vignea* Sp. **193**, fig. **23** (6); 1966; 东北草本植物志 **11**: 202, 1976; 内蒙古植物志 **8**: 65, 1985.

根状茎短，具短匍匐茎。秆疏丛生，高 20—50 厘米，纤细，三棱形，稍坚挺，平滑或近于平滑。叶短于秆，宽 1—1.5 毫米，平张或内卷，微粗糙。苞片鳞片状。小穗 2—4 个，球形，长 3—4 毫米，雌雄顺序，具少花，聚集成头状或稍疏松的穗状花序。雌花鳞片卵形，长 2—2.5 毫米，苍白色至淡黄色，背面中脉淡褐色，边缘膜质。果囊与鳞片近等长，卵形或椭圆形，平凸状，长 2—2.5 毫米，近革质，淡黄绿色，具白色小点，两面具褐紫色脉 5—9 条，基部圆形，近无柄，顶端喙不明显，喙口微 2 齿裂。小坚果紧包于果囊中，椭圆形或宽椭圆形，双凸状，长约 1.2 毫米，基部楔形，顶端圆形或截形；花柱基部不膨大，柱头 2 个。 花果期 7 月。

产吉林、内蒙古；生于沼泽，海拔 900 米。分布欧洲（东北部、俄罗斯北部至高加索）、亚洲〔俄罗斯（西伯利亚、远东地区）、蒙古北部、朝鲜北部、日本（北海道、本州）〕、北美洲（加拿大、美国阿拉斯加至明尼苏克）。模式标本采自瑞典。