

永胜以及中部的峨山等地区,在海拔 1 500—2 300 米的范围内有少量分布。由于植株低矮、树形美观,适宜做高级盆景观赏和庭园绿化植物。

3. 山棕榈(中国树木分类学)

Trachycarpus martianus (Wall.) H. Wendl. in Bull. Soc. Bot. France 8: 429. 1861; Becc. et Hook. f. in Hook. f., Fl. Brit. Ind. 6: 436. 1892; Becc. in Webbia 5(1): 69. 1920 et in Ann. Roy. Bot. Gard. Calc. 13: 275. 1931; Hand.-Mazz., Symb. Sin. 7(5): 1360. 1936; 陈嵘, 中国树木分类学 90. 1959. — *Chamaecrops martiana* Wall. Cat. n. 8 621. 1832; Mart. in Wall. Pl. As. Rar. 3: 5. t. 211. 1830—32 et Hist. Nat. Palm. 3: 251. 1850. — *Ch. khasiana* Griff. in Calc. Journ. Nat. Hist. 5: 341. 1845 et Palm. Brit. East Ind. 134. t. 227A, B. 1850; Kurz, For. Fl. Brit. Burma 2: 527. 1877. — *Trachycarpus khasiana* H. Wendl. in Bull. Bot. Soc. France 8: 429. 1861; Hook. f. in Cutris's Bot. Mag. 116: t. 7 128. 1890.

乔木状,高达 15—17 米,老枯的叶片脱落,树干裸露。叶片呈 3/4 圆形,整齐地分裂至中部成多数(可达 60 片)线状披针形的裂片,中部裂片长 60—80 厘米,宽 3—3.5 厘米,先端具深 2 裂渐尖的顶尖。叶柄边缘具细圆齿状的齿,顶端戟突明显。花雌雄异株,花序粗壮,多次分枝,从叶腋伸出;雌雄花序相似,雄花序比雌花序的佛焰苞更宽并具较密集而短的分枝;雄花近球状三棱形,单生,有时成对着生于近梗状的小瘤突上,花萼 3 片,三角形急尖,基部浅合生,花冠 2 倍长于花萼,花瓣阔卵形,雄蕊与花瓣等长,花丝钻状,花药宽,具近双生和几分离的药室,心皮无毛;雌花序轴被微柔毛;雌花球状卵形,通常单生,花萼几裂达基部成 3 个阔卵形裂片,花冠长于花萼 1/3;花瓣阔卵形急尖,退化雄蕊约与花瓣等长或较短,具戟形花药,心皮梭形,一面膨起,密被黄褐色毛,具短而无毛的圆锥状花柱,柱头具细点。果实完全成熟时淡蓝色,长圆状椭圆形,长 10—12 毫米,宽 7—8 毫米,略扁,两端等圆。种子背面凸起,沿种脊面有深沟槽,并有深的珠被侵入物;胚乳角质均匀,胚侧生。

本种原产喜马拉雅山的中部和东部及缅甸等地;据文献记载:我国云南西部和西北部有分布,但目前尚未见到标本,以上描述仅根据文献摘译。

3. 石山棕属——*Guihaia* J. Dransf., S. K. Lee et F. N. Wei

J. Dransf., S. K. Lee et F. N. Wei in Principes 29: 7. 1985;

N. Uhl et J. Dransf., Gen. Palm. 187—189. 1987.

植株矮,丛生,茎短或很短,叶鞘被针刺状或网状纤维。叶掌状分裂,扇形或近圆形,裂片外向折叠,具单折(罕为 2 折),最外边的仅半折,几深裂至 3/4 或 4/5,上面深绿色,无毛,背面密被毡状银白色绒毛或无毛,但具星散的点状鳞片,边缘具细齿或光滑;横小脉