

宽(2—)3—5(—8.5)厘米,叶鞘囊状凸起处有刺¹⁾,罕无刺(倒卵果省藤),其余处亦有各式的刺;果实较大,长1.5—3厘米,直径1.2—2.3厘米;鳞片(14—)15—18—21纵列。

47. 羽片整齐或不规则排列。

48. 羽片整齐排列(在幼龄株上不整齐),披针形,长30—40厘米,宽3—5厘米;果实椭圆形,长1.6厘米,直径1.2厘米;鳞片14—17纵列……………

…………… 34. 阔叶省藤 *C. orientalis* C. E. Chang

48. 羽片不规则排列(基生叶2—3片成组排列),狭披针形或披针形,长36—40厘米,宽2—5厘米;果实球形或近球形,全长2.8—3厘米,直径2—2.3厘米;鳞片18纵列……………

…………… 35. 单叶省藤 *C. simplicifolius* C. F. Wei

47. 羽片成组排列。

49. 羽片通常每2片成组(对)排列,基部或顶部的羽片单生。

50. 羽片较少,每对羽片约叉开45°角,下部的偶有单生,椭圆状披针形,长14—15厘米,宽3.5—4厘米;果实卵球形或椭圆形,草黄色,长1.8厘米,直径1.2厘米;鳞片15纵列……………

…………… 36. 桂南省藤¹⁾ *C. austro-guangxiensis* S. J. Pei et S. Y. Chen

50. 羽片较多,叶基部和顶部的羽片为单生,披针形,长30—35厘米,宽4.5—6.5厘米;果实倒卵球形,全长3.4厘米,直径2.2厘米(最宽处),鲜时黄白色,干时淡黄色;鳞片21纵列……………

…………… 37. 倒卵果省藤 *C. obovoideus* S. J. Pei et S. Y. Chen

49. 羽片2—4片成组排列。

51. 羽片每2(—3)片成组排列,两面绿色,披针形,长10—17厘米,宽2—3厘米;果实卵球形,长1.5—2厘米,直径1.6厘米;鳞片(18—)20纵列……………

…………… 38. 短叶省藤 *C. egregius* Burret

51. 羽片2—4片成组排列,上面绿色,背面苍白色,长圆形或倒披针形,长35—42厘米,宽5—8.5厘米;果实卵状椭圆形,全长1.7—2.2厘米,直径1—1.4厘米;鳞片18—20纵列。

52. 雌花序长60—100厘米,分枝花序长25—30厘米,每侧有6—10个小穗状花序;果实全长2.2厘米,直径1.3—1.4厘米;鳞片18纵列……………

…………… 39a. 宽刺藤 *C. platyacanthus* Warb. ex Becc. var. *platyacanthus*

52. 雌花序比原变种长约1倍,分枝花序较长,小穗状花序较多;果实较小,全长1.7厘米,直径1厘米;鳞片多1—2纵列…………… 39b. 中穗省藤

C. platyacanthus Warb. ex Becc. var. *mediostachys* S. J. Pei et S. Y. Chen

1. 毛鳞省藤(广西植物)

Calamus thysanolepis Hance in Journ. Bot. 12:265. 1874; Becc. in Rec. Bot. Surv. Ind. 2:216. 1902 et in Ann. Roy. Bot. Gard. Calc. 11(1):487. t. 224. 1908; C. F. Wei in Guihaia 6:23. 1986, p. p. (excl. *C. hoplites* Dunn).

1a. 毛鳞省藤(原变种)

var. *thysanolepis*

几无茎,丛生,高2—3米。叶羽状全裂,长0.8—1.6米,顶端不具纤鞭;羽片多数,两面黄绿色,每2—6片成组聚生于叶轴两侧,并指向不同方向,剑形,先端渐尖,长30—37

1) 桂南省藤的叶鞘情况未知。