

4. 绿色山槟榔 (新拟)

Pinanga viridis Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin 13:186. 1936.

丛生灌木,高2—4米,直径1—1.8厘米,密被深褐色头屑状斑纹。叶鞘、叶柄及叶轴上均被有深褐色头屑状斑点。叶长约70厘米或更长,顶端一对羽片较宽,宽6厘米或更宽,长约30厘米,先端截形,具短2裂的钝齿,具8—9条叶脉,其余羽片较狭,几等距排列,S字形弯曲,向上镰刀状渐尖,向下渐狭,长40—45厘米,宽4—6厘米,约有5条叶脉,两面绿色,整个叶背面具淡褐色的鳞片和淡色细柔毛,小叶脉稍苍白。花序具(2—)3—4个分枝,下弯,长15—18厘米,穗轴稍曲折,压扁。果实2列,排列较稀疏,果实纺锤形,连果被长2厘米,直径约7毫米,上部稍狭,顶端稍粗。果期10月。

产广东中部、广西西南部和云南东南部。生于海拔600—1200米的森林中。

5. 华山竹 (云南种子植物名录) 图版 32:3—5

Pinanga chinensis Becc. in Webbia 1:326. 1905.

丛生灌木,高约2米,直径约1.2厘米或更粗,有深褐色头屑状斑点,间有淡色斑点。叶鞘、叶柄和叶轴上均有褐色鳞秕。叶羽状全裂,长约55厘米,约有10对整齐排列的羽片,狭长方形,顶端一对羽片稍短,长约18厘米,宽2.5—3厘米,先端截状,具二锐裂的齿,以下的羽片稍长,约25—30厘米,宽度与上部的相近,除上部几对羽片先端截状具齿外,下部的羽片向先端渐尖,略成镰刀状,向基部略为变狭,具明显的叶脉2—4条,叶面深绿,背面灰白色,具密集的纵向小叶脉,叶脉上具稍粗糙的乳头状突起。花序约有4个分枝,下弯,长约12厘米,穗轴曲折,明显压扁,果实整齐2列。果实幼时近圆柱形,顶端渐尖,成长时为近纺锤形,连果被长约17—18毫米,直径约6毫米,向顶端稍渐狭,顶端钝,果实表面具纵条纹。果期5—6月。

产云南南部至西南部。生于海拔800—1200米的热带与亚热带森林中。

6. 燕尾山槟榔 (中国高等植物图鉴) 瑶山山槟榔 (广西)

Pinanga sinii Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin 10:882. 1930 et 13:186. 1936.

丛生灌木,高3米或更高,直径1—1.3厘米,密被紫色或紫褐色头屑状物,间有浅色的斑纹。叶鞘、叶柄和叶轴上均有褐色或红褐色的较粗的鳞秕状斑点。叶羽状,长50—60厘米,约有5对对生的羽片,顶部有一对羽片几乎为狭长方形,长约18厘米,宽约6厘米或更宽,先端截形,具锐齿裂,具9—11条叶脉;顶端以下的羽片为S字形弯曲,向上部镰刀状弯曲渐尖,向基部稍微变狭,长30—38厘米,宽3—6厘米,具3—6条叶脉,上面深绿色,背面灰白色或灰绿色,叶脉及小叶脉上被短的白色柔毛和密被褐色的点状鳞片。花序具2—4个分枝或罕为不分枝,下弯,长11—14厘米,穗轴明显压扁、曲折,花成2列排列。果未熟时为狭圆柱形,成熟时红色,卵状椭圆形,长16—18毫米,直径约8毫米,顶端具短尖头。胚乳嚼烂状。果期10—11月。

产广东西部和广西西部至东部。生于海拔450—850米的森林中。云南东南部也可