

线形,长30—40厘米;肉穗花序斜向上或近直立,狭锥状圆柱形,长4.5—6.5(—8)厘米,直径6—12毫米。花黄绿色,花被片长约2.5毫米,宽约1毫米;花丝长2.5毫米,宽约1毫米;子房长圆柱形,长3毫米,粗1.25毫米。浆果长圆形,红色。花期(2—)6—9月。

全国各省区均产。生于海拔2600米以下的水边、沼泽湿地或湖泊浮岛上,也常有栽培。南北两半球的温带、亚热带都有分布。

1b. 细根菖蒲

A. calamus L. var. **verus** L., Sp. Pl. ed. 1: 324. 1753; Engl. in Engl., Pflanzenr. 21 (4, 23B): 331. 1905.

根茎纤细;叶较狭,宽6—8毫米;肉穗花序小,长3—5厘米;佛焰苞为肉穗花序长的4—8倍。花期5—9月。

产云南西双版纳,海拔1500—1750米,生于水池边。分布于锡金、孟加拉、印度、斯里兰卡。

菖蒲及下述各种菖蒲的根茎均入药。市上商品菖蒲和各中医所用菖蒲种类均不统一。李时珍认为菖蒲正品应为“生于水石之间,叶具剑脊,瘦根节密,高尺余者,石菖蒲也”。这里指的就是本种菖蒲。但现今大部分地区多用石菖蒲 *A. tatarinowii* 或栽培的金钱蒲 *A. gramineus*, 可见种类虽不同,疗效无大异。菖蒲味辛,苦,性温,能开窍化痰,辟秽杀虫。主治痰涎壅闭、神识不清、慢性气管炎、痢疾、肠炎、腹胀腹痛、食欲不振、风寒湿痹,外用敷疮疥。兽医用全草治牛臃胀病、肚胀病、百叶胃病、胀胆病、发疯狂、泻血痢、炭疽病、伤寒等。

2. **石菖蒲**(各地通称) 九节菖蒲(江苏、浙江、江西、湖南),紫耳、薄菖蒲、石蜈蚣、岩菖蒲、臭菖(广东)、“骨首”(云南彝族语)、“格密亲”(傣族语),野韭菜、水蜈蚣、香草(云南玉溪),菖蒲(各地),夜晚香(四川金城山),水菖蒲(四川彭水、兴文),回手香、随手香(四川峨眉),山艾(四川石柱),小石菖蒲(四川合川) 图版1: 5

Acorus tatarinowii Schott in Osterr. Bot. Zeitschr. 9: 101. 1859; Hand.-Mazt., Symb. Sin. 7: 1361. 1936; S. Y. Hu in Dansk Bot. Arkiv 23 (4): 416. 1968.—*A. gramineus* auct. non Soland.; Hook. f., Fl. Brit. Ind. 6: 555. 1893 p. p.; Engl. in Engl., Pflanzenr. 21 (4, 23B): 312. 1905 p. p., excl. var. pusillus; Gagn. in Lecte., Fl. Gén. Indo-Chine, 6: 1079, fig. 102, 1—2. 1942 p. p.—*A. gramineus* var. *crassispadix* Lingsh. in Rep. Sp. Nov., Beih. 12: 312. 1922.—*A. calamus* auct. non L.; Lour., Fl. Cochinch. 208. 1790; Benth., Fl. Hongkong. 345. 1861.

多年生草本。根茎芳香,粗2—5毫米,外部淡褐色,节间长3—5毫米,根肉质,具多数须根,根茎上部分枝甚密,植株因而成丛生状,分枝常被纤维状宿存叶基。叶无柄,叶片薄,基部两侧膜质叶鞘宽可达5毫米,上延几达叶片中部,渐狭,脱落;叶片暗绿色,线形,