

长20—30(—50)厘米,基部对折,中部以上平展,宽7—13毫米,先端渐狭,无中肋,平行脉多数,稍隆起。花序柄腋生,长4—15厘米,三棱形。叶状佛焰苞长13—25厘米,为肉穗花序长的2—5倍或更长,稀近等长;肉穗花序圆柱状,长(2.5—)4—6.5(—8.5)厘米,粗4—7毫米,上部渐尖,直立或稍弯。花白色。成熟果序长7—8厘米,粗可达1厘米。幼果绿色,成熟时黄绿色或黄白色。 花果期2—6月。

产黄河以南各省区。常见于海拔20—2600米的密林下,生长于湿地或溪旁石上。印度东北部至泰国北部也有。

根茎入药,详见菖蒲。

3. 长苞菖蒲

Acorus rumphianus S. Y. Hu in Dansk Bot. Arkiv 23 (4): 416. 1968.——*A. terrestris* Rumph. ex Schott, Prodr. 579. 1860, non Sprengel 1825.

多年生草本。根茎棕褐色,粗约1厘米,被纤维状宿存叶基;根肉质,圆柱形,具分枝须根。叶基两侧膜质叶鞘淡黄色,宽约3毫米,上延10—15厘米,仅在上部变狭,脱落;叶片线形,较宽大,长40—50厘米,中部宽1.5—1.8厘米,基部对折,带棕色,中部以上平展,先端渐尖,干时叶表面暗绿色,背面中央淡绿色,两侧绿色;无中肋,有多数平行脉。花序柄绿色,长9.5厘米。肉穗花序白色,直立,圆柱形,长6厘米,粗约5毫米。叶状佛焰苞基部(肉穗花序着生处)镶以长约1厘米、宽1毫米的膜质边缘,线形,长约45厘米,为肉穗花序长的7倍,基部较狭,展开宽约6毫米,中部宽1.5厘米,先端渐尖。 花期12月。

产云南麻栗坡老君山,生于海拔1100—1300米的溪旁阴湿地。越南、泰国至印度尼西亚的爪哇也有分布。

根茎入药,详见菖蒲。

本种叶片宽长,长40—50厘米,宽1.5—1.8厘米;佛焰苞长为肉穗花序的7—8倍;肉穗花序白色,皆与前述的石菖蒲不同。

4. 金钱蒲(通称) 钱蒲、菖蒲、石菖蒲(本草纲目,植物名实图考),九节菖蒲(滇南本草),建菖蒲(四川),小石菖蒲(四川南江),随手香(四川宣汉)

Acorus gramineus Soland. in Ait. Hort. Kew. ed. 1: 474. 1789, ed. 2, 2: 305. 1811; Engl. in DC., Monogr. Phan., 2: 218. 1879. p. p., in Engl., Pflanzenr. 21 (4, 23B): 312. 1905 p. p.; Hook. f., Fl. Brit. Ind. 6: 556. 1893 p. p.; Brown in Journ. Linn. Soc. Bot. 36: 187. 1903 p. p.; Merr. in Lingn. Sci. Journ. 5: 43. 1927. p. p.; Hand.-Mazt., Symb. Sin. 7: 1361. 1936; Gagn. in Lecte., Fl. Gén. Indo-Chine 6: 1879 (fig. 102 est *A. tatarinowii*). 1942. p. p.——*A. gramineus* Soland. var. *pusillus* (Sieb.) Engl. in DC., Monogr. Phan. 2: 218. 1879.——*A. pusillus* Sieb. in Vern. Batav. Genootsch. 12: 2. 1830.

多年生草本,高20—30厘米。根茎较短,长5—10厘米,横走或斜伸,芳香,外皮淡黄