

色,节间长1—5毫米;根肉质,多数,长可达15厘米;须根密集。根茎上部多分枝,呈丛生状。叶基对折,两侧膜质叶鞘棕色,下部宽2—3毫米,上延至叶片中部以下,渐狭,脱落。叶片质地较厚,线形,绿色,长20—30厘米,极狭,宽不足6毫米,先端长渐尖,无中肋,平行脉多数。花序柄长2.5—9(—15)厘米。叶状佛焰苞短,长3—9(—14)厘米,为肉穗花序长的1—2倍,稀比肉穗花序短,狭,宽1—2毫米。肉穗花序黄绿色,圆柱形,长3—9.5厘米,粗3—5毫米,果序粗达1厘米,果黄绿色。花期5—6月,果7—8月成熟。

产浙江、江西、湖北、湖南、广东、广西、陕西、甘肃、四川、贵州、云南、西藏。生于海拔1800米以下的水旁湿地或石上。各地常栽培。

根茎入药,详见菖蒲。

栽培的金钱蒲,个体很小,一般高仅3—5厘米,应属本种范畴。但在野生植物的干标本上,本种与石菖蒲 *A. tatarinowii* 很难识别。因为叶片和佛焰苞的长短宽狭都有很大的相对性,随生长季节的不同和局部环境的差异而有所不同,据中医和老药工的经验,鲜植物较易区分:石菖蒲叶片质地薄,较宽长,揉之气味辛辣,多生长于沼泽或浅水域;金钱蒲叶片厚,较窄小,芳香,手触摸之后香气长时不散,因谓“随手香”,多生长于湿地或石上,医药上多用后者。

2. 花烛族——Trib. Anthuriceae Engl.

Engl. in DC., Monogr. Phan. 2: 63. 1879.

直立、匍匐或攀援灌木。叶具柄。佛焰苞具特异颜色。肉穗花序无附属器。花两性,有花被,花丝扁平,子房2室,每室胚珠1,稀2。种子有胚乳,胚具轴。

1属,产热带美洲,我国有引种栽培。

2. 花烛属——*Anthurium* Schott

Schott in Wien. Zeitschr. 3: 828. 1829.

上升或匍匐草本,或为攀援灌木。叶形各式,全缘或浅裂,深裂或掌状分裂;叶柄明显,基部具短鞘,先端有膨大的关节,花序柄大都伸长,稀很短。佛焰苞宿存,大都扁平,披针形,卵形或椭圆形,绿色、紫色、白色或绯红色,基部常下延。肉穗花序无梗或具短梗,圆柱形、圆锥形或有时成尾状,绿色、青紫色,稀白色、黄色或绯红色,花由基部向上开放。果序常增大。花两性,有花被。花瓣4,长宽几相等,先端拱状内弯,靠合,几截平,外轮2枚常较宽,内轮的内藏,有时4个花瓣排列为不整齐的覆瓦状,果时强裂增大;雄蕊4,花丝扁,先端略狭为药隔,与花瓣等长,花药短,药室卵形或长圆卵形,外向纵裂;子房卵圆形、长圆形或倒卵圆形,顶部平或渐狭为花柱,2室,每室胚珠2或1,倒生或弯生,珠柄短;着生于室的内侧,花柱不存在或很短,柱头小,盘状,近圆形或长圆形,浅2裂。浆果肉质,近球形、卵圆形、倒卵圆形、倒卵状长圆形、近陀螺状、长纺锤形,绿色、橙黄色、绯红色、紫色。

种子成熟时渐次从花瓣中推出,长圆形,扁凸,珠孔外凸,珠被具疣突。胚乳丰富。胚具轴,近圆柱形;长不及胚乳。

约 550 种,产热带美洲。现各热带地区引种栽培。我国较常栽的有 2 种。

分 种 检 索 表

1. 叶片 5—13 掌状分裂,裂片基部联合 $1/5—1/4$; 草本……………1. 掌叶花烛 *A. pedato-radiatum* Schott
1. 成熟枝上叶片 7—9 掌状全裂,裂片分离; 藤本……………2. 深裂花烛 *A. variabile* Kunth

1. 掌叶花烛

Anthurium pedato-radiatum Schott in Bonpl. 7: 337. 1859; Engl. in Engl., Pflanzenr. 21 (4, 23B): 282, fig. 78. 1905.

茎上升,长 1 米以上,粗 5 厘米。叶柄圆柱形,长几达 1 米,具浅槽,关节长。叶片轮廓圆形,直径 40—50 厘米,亮绿色,具光泽,7—13 深裂,裂片披针形或线状披针形,渐尖,最外侧的镰状,各裂片基部联合 $1/5—1/4$,中肋在背面隆起,侧脉纤细,斜伸,集合脉与边缘稍远离。花序柄长 40—60 厘米。佛焰苞长 15 厘米,下部宽 2.5 厘米,披针形;中部以上渐狭,淡红色,发亮,直立,后期反折。肉穗花序具长 3 毫米的短梗,长 10 厘米,粗 7.5 毫米。果序长 15 厘米,绿色。花被长宽 2 毫米。浆果长 1.5 厘米,粗 1.2 厘米,倒卵形,橙黄色,种皮黄色,有细疣。花期 7—8 月(昆明)。

原产墨西哥。我国广东、云南栽培供观赏。

2. 深裂花烛

Anthurium variabile Kunth, Enum. Pl. 3: 81. 1841, Engl. in Engl., Pflanzenr. 21 (4, 23B): 290, fig. 82. 1905.

攀援植物,幼枝纤细,节间伸长。叶柄圆柱形,长 30—45 厘米,关节短,具槽;叶片 7—9 裂,裂片分离,有长 0.5—1 厘米的柄,长披针形或披针状长圆形,向上渐狭,基部楔形,长约 20 厘米,宽 2—4 厘米,外侧裂片外侧圆形或耳状。花序柄短,长 3—10 厘米。佛焰苞披针形,渐尖,反折,深绿色,比肉穗花序稍短,长 6 厘米,宽 1.5 厘米。肉穗花序无梗,锥状圆柱形,青紫色,长约 10 厘米,下部粗 6—8 毫米。花瓣宽胜于长。花丝宽线形,长 2 毫米。子房长圆形,长约 2 毫米。浆果倒卵圆形,长 4 毫米,深绿色,顶部紫色。种子短卵圆形,顶部截平。

原产巴西。我国福建、广东栽培供观赏。

3. 臭菘族——Trib. Dracontiae Hutch.

Hutch., Fam. Flow. Pl. ed. 1, 2: 119, 120. 1934.

草本植物。叶柄不扁平,也不为叶状;叶片心形,全缘。佛焰苞罩状罩住肉穗花序。肉穗花序无附属器。花两性,有花被。子房 1 室。