

种子成熟时渐次从花瓣中推出,长圆形,扁凸,珠孔外凸,珠被具疣突。胚乳丰富。胚具轴,近圆柱形;长不及胚乳。

约 550 种,产热带美洲。现各热带地区引种栽培。我国较常栽的有 2 种。

分 种 检 索 表

1. 叶片 5—13 掌状分裂,裂片基部联合 $1/5—1/4$; 草本……………1. 掌叶花烛 *A. pedato-radiatum* Schott
1. 成熟枝上叶片 7—9 掌状全裂,裂片分离; 藤本……………2. 深裂花烛 *A. variabile* Kunth

1. 掌叶花烛

Anthurium pedato-radiatum Schott in Bonpl. 7: 337. 1859; Engl. in Engl., Pflanzenr. 21 (4, 23B): 282, fig. 78. 1905.

茎上升,长 1 米以上,粗 5 厘米。叶柄圆柱形,长几达 1 米,具浅槽,关节长。叶片轮廓圆形,直径 40—50 厘米,亮绿色,具光泽,7—13 深裂,裂片披针形或线状披针形,渐尖,最外侧的镰状,各裂片基部联合 $1/5—1/4$,中肋在背面隆起,侧脉纤细,斜伸,集合脉与边缘稍远离。花序柄长 40—60 厘米。佛焰苞长 15 厘米,下部宽 2.5 厘米,披针形;中部以上渐狭,淡红色,发亮,直立,后期反折。肉穗花序具长 3 毫米的短梗,长 10 厘米,粗 7.5 毫米。果序长 15 厘米,绿色。花被长宽 2 毫米。浆果长 1.5 厘米,粗 1.2 厘米,倒卵形,橙黄色,种皮黄色,有细疣。花期 7—8 月(昆明)。

原产墨西哥。我国广东、云南栽培供观赏。

2. 深裂花烛

Anthurium variabile Kunth, Enum. Pl. 3: 81. 1841, Engl. in Engl., Pflanzenr. 21 (4, 23B): 290, fig. 82. 1905.

攀援植物,幼枝纤细,节间伸长。叶柄圆柱形,长 30—45 厘米,关节短,具槽;叶片 7—9 裂,裂片分离,有长 0.5—1 厘米的柄,长披针形或披针状长圆形,向上渐狭,基部楔形,长约 20 厘米,宽 2—4 厘米,外侧裂片外侧圆形或耳状。花序柄短,长 3—10 厘米。佛焰苞披针形,渐尖,反折,深绿色,比肉穗花序稍短,长 6 厘米,宽 1.5 厘米。肉穗花序无梗,锥状圆柱形,青紫色,长约 10 厘米,下部粗 6—8 毫米。花瓣宽胜于长。花丝宽线形,长 2 毫米。子房长圆形,长约 2 毫米。浆果倒卵圆形,长 4 毫米,深绿色,顶部紫色。种子短卵圆形,顶部截平。

原产巴西。我国福建、广东栽培供观赏。

3. 臭菘族——Trib. Dracontiae Hutch.

Hutch., Fam. Flow. Pl. ed. 1, 2: 119, 120. 1934.

草本植物。叶柄不扁平,也不为叶状;叶片心形,全缘。佛焰苞罩状罩住肉穗花序。肉穗花序无附属器。花两性,有花被。子房 1 室。