

Merr. in Lingn. Sci. Journ. 5: 42. 1927; S. Y. Hu in Dansk Bot. Arkiv 23(4): 414. 1968.——*P. yunnanensis* Engl. in Engl., Pflanzenr. 21 (4, 23B): 28. 1905, Gagn. in Lecte., Fl. Gén. Indo-Chine 6: 1086. 1942.

7a. 石柑子(原变种)

Pothos chinensis* (Raf.) Merr. var. *chinensis

附生藤本,长0.4—6米。茎亚木质,淡褐色,近圆柱形,具纵条纹,粗约2厘米,节间长1—4厘米,节上常束生长1—3厘米的气生根;分枝,枝下部常具鳞叶1枚;鳞叶线形,长4—8厘米,宽3—7毫米,锐尖,具多数平行纵脉。叶片纸质,鲜时表面深绿色,背面淡绿色,干后表面黄绿色,背面淡黄色,椭圆形,披针状卵形至披针状长圆形,长6—13厘米,宽1.5—5.6厘米,先端渐尖至长渐尖,常有芒状尖头,基部钝;中肋在表面稍下陷,背面隆起,侧脉4对,最下一对基出,弧形上升,细脉多数,近平行;叶柄倒卵状长圆形或楔形,长1—4厘米,宽0.5—1.2厘米,约为叶片大小的1/6。花序腋生,基部具苞片4—5(—6)枚;苞片卵形,长5毫米,上部的渐大,纵脉多数;花序柄长0.8—1.8(—2)厘米;佛焰苞卵状,绿色,长8毫米,展开宽10(—15)毫米,锐尖;肉穗花序短,椭圆形至近圆球形,淡绿色、淡黄色,长7—8(—11)毫米,粗5—6(—10)毫米,花序梗长3—5(—8)毫米。浆果黄绿色至红色,卵形或长圆形,长约1厘米。 花果期四季。

产我国台湾、湖北、广东、广西、四川、贵州、云南各省区海拔2400米以下的阴湿密林中,常匍匐于岩石上或附生于树干上。越南、老挝、泰国也有。

7b. 长柄石柑

***Pothos chinensis* (Raf.) Merr. var. *lotienensis* C. Y. Wu et H. Li**,植物分类学报 15 (2): 101. 1977.

与原变种不同之点为花序柄特长,达2.5厘米。 花期4—6月。

产贵州罗甸县罗妥、望谟、安龙等南部地区,生于海拔520—1100米的阴湿山谷岩石上。

原种及变种的茎叶供药用。能祛风解暑、消食止咳、镇痛;治风湿麻木、跌打损伤、骨折、咳嗽、气痛、小儿疳积。

8. 百足藤(广东徐闻、澄迈) 细蜈蚣草、蜈蚣草(广西玉林),姜藤(广西龙州),石蜈蚣(广西陆川),下山蜈蚣(广西博白),蜈蚣藤(广东澄迈),鸭子草(广东保亭) 图版3: 9

***Pothos repens* (Lour.) Druce** in Rept. Bot. Exch. Club. Brit. Isles. 4: 641. 1917; (Lour.) Merr. in Philip. Journ. Sc. 15: 228. 1919 et in Lingn. Sci. Journ. 5: 42. 1927.——*Flagellaria repens* Lour., Fl. Cochinch. 212. 1790, ed. Willd. 1: 263. 1793.——*Pothos loureiri* Hook. et Arn. in Bot. Beech. Voy.: 220. 1841; Engl. in DC., Monogr. Phan. 2: 87. 1879 et in Engl., Pflanzenr. 21 (4, 23B): 35, fig. 15. 1905; Hook. f. in Curtis, Bot. Mag. 126: t. 7744. 1900; N. E.