

弧曲,其间细脉微弱。花序柄长15—30厘米,粗0.8—1.2厘米;佛焰苞外面绿色,内面白色,长4—6厘米,稀更长,宽3—3.5厘米,具长1厘米的尖头,果期宿存而不增大。肉穗花序长1.5—3厘米,花期粗1厘米;果序近球形,宽椭圆状,长4.5厘米,粗3厘米,具长5—7毫米的梗。花期6—7月,果期8月。

产内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁。海拔1100米以下,常于草甸、沼泽等浅水域成片生长。欧洲、亚洲、美洲的北温带和亚北极地区广泛分布。

7. 龟背竹族——Trib. Monstereae Engl.

Engl., in Nov. Act. Acad. Nat. Cur. 39 (3): 143. 1876.

陆生或附生攀援植物。佛焰苞通常美丽,脱落。肉穗花序无附属器。花两性,无花被。

11属,我国有6属,其中包括1个栽培的属。

9. 雷公连属——*Amydrium* Schott

Schott, Ann. Mus. Lugd. Bot. 1:127. 1863.——*Epipremnopsis* Engl. in Engl., Pflanzenr. 37 (4, 23B), Additamentum ad Araceas-Pothoideas; 1. 1908.

攀援藤本,叶常远离。叶柄基部或几全部鞘状;叶片全缘,具穿孔或羽状分裂,穿孔如存在则常大,圆形或卵形。花序柄单生。佛焰苞卵形,反折。肉穗花序具长梗或无梗。花两性,无花被。雄蕊4—6;花丝短,宽线形,花药卵形,与花丝等长或稍短,药室卵圆形,侧向纵裂。雌蕊倒金字塔形或倒圆锥形:子房1室,胚珠2,倒生或横生,珠柄短,着生于隆起的侧膜胎座的中部以下;花柱由室腔稍外露,纵向,柱头小,长圆形或圆形。浆果近球形,顶部平截,种子1或2,近球形,无胚乳。胚具长轴。

约6种,分布于印度至马来西亚,我国有两种。

分 种 检 索 表

1. 叶片全缘,完整;肉穗花序倒卵形,长4厘米,上部粗约1.8厘米;柱头圆形 1. 雷公连 *A. sinense* (Engl.) H. Li
1. 叶片具大大小小的长圆形穿孔;肉穗花序圆柱形,长6厘米,粗约1.3厘米,柱头长圆形 2. 穿心藤 *A. hainanense* (Ting et Wu ex H. Li et al.) H. Li

1. 雷公连(贵州罗甸) 大匹药、风湿药(贵州罗甸), 软筋藤(贵州镇远, 四川南川), 大软筋藤(贵州剑河、兴仁), 九龙上吊(贵州剑河), 野红苕(贵州榕江); 青藤(湖南辰溪), “叫四门”、“叫恩妈”(侗族语), 下山虎(湖南通道) 新组合 图版4: 8—10

Amydrium sinense (Engl.) H. Li, comb. nov.——*Epipremnopsis sinensis* (Engl.) H. Li, 植物分类学报 15 (2): 102, 图版 5: 1. 1977.——? *Scindapsus sinensis* Engl. in Engl., Bot. Jahrb. 29: 234. 1900; N. E. Brown in Journ.