

147. 1825.——*Scindapsus montanus* Kunth, Enum. Pl. 3: 64. 1841.——*Anaden-dron lobbii* Schott in Bonpl. 5: 45. 1857.——*Pothos malaianus* Miq., Fl. Ind. Bat. Suppl. 596. 1861.

附生攀援植物。茎粗4—5毫米，节间伸长，长2.5厘米，上部者甚短缩；节上生肉质气生根，长1—2厘米。叶柄长10—15厘米，叶鞘几达叶柄顶端，长9—14厘米，展开，宽达10毫米，大部分早落，仅沿叶柄的少部分宿存；叶片干时淡褐色、纸质，长圆状披针形，全缘，长15—20厘米，宽5—8厘米，极不等侧，常一侧比他侧宽1/2，先端渐尖，常具芒状尖头，基部钝或微心形；侧脉7—8对，基部沿中脉下延，其间有2—3条II级侧脉，网结。花序腋生和顶生；序柄长10—15厘米，从鞘状苞片中伸出；苞片线形，长约7厘米，先端渐尖，具长5—7毫米的线状尖头。佛焰苞席卷近圆柱形，展开为卵状披针形，长3—6厘米，两端强度变狭，先端有长1—1.5厘米的喙。肉穗花序具长5—8毫米的梗，粉绿色，长3—3.5厘米，两头渐狭；花密，花被环状，高为子房的1/2或稍多；雄蕊4，花丝基部宽，花药外向，药室卵形，先端与子房平齐；子房倒圆锥形，顶端宽3毫米；柱头横向，长圆形。浆果卵圆形，长8毫米，顶部平截。花果期6—10月。

产广东海南、云南东南部，海拔500米以下，附生于林内树干或石上。越南、老挝、泰国、马来西亚、新加坡、印度尼西亚(至苏拉威西岛)也有。

2. 宽叶上树南星

Anadendrum latifolium Hook. f., Fl. Brit. Ind. 6: 540. 1893; Engl. in Engl., Pflanzenr. 21 (4, 23B): 49. 1905; Ridl., Fl. Malay Penins. 5: 115. 1925; Gagn. in Lecte., Fl. Gén. Indo-Chine 6: 1093, fig. 103; 1—4. 1942 ('*Anaden-dron*').

附生攀援植物，高0.4—3米。茎粗4—5毫米，节间长1.5—3厘米，气生根肉质，较粗，长可达4—5厘米。叶柄长11—17厘米，基部扩展，具狭鞘，鞘宽5—7毫米。花序无苞片，沿叶鞘伸出，序柄长达25厘米。佛焰苞纺锤形，长5—6厘米，展开为披针形，渐尖，基部狭。肉穗花序圆柱形，长3—5.8厘米(云南标本)，有长达2厘米的梗。花极密，上面四角形或菱形，花被环状，高为子房之半；雄蕊4，交叉对生；花丝基部宽，药室基部叉开，长约1毫米，顶端开裂；子房倒圆锥形，顶部宽3毫米，柱头横线形，稍突起。浆果黄绿色，干时黑色，卵圆形，顶部几截平，长约10毫米。花果期4—5月。

产云南东南部，海拔100—250米，生于林下荫处。越南至马来半岛有分布。

11. 麒麟叶属——*Epipremnum* Schott

Schott in Bonpl. 5: 45. 1857.

藤本植物，常攀登于石上或树上。叶大，全缘或羽状分裂，沿中肋两侧常有小孔，叶柄具鞘，上端有关节。花序柄粗壮，佛焰苞卵形，多少渐尖。肉穗花序无柄，全部具花。花两