

147. 1825.——*Scindapsus montanus* Kunth, Enum. Pl. 3: 64. 1841.——*Anaden-dron lobbii* Schott in Bonpl. 5: 45. 1857.——*Pothos malaianus* Miq., Fl. Ind. Bat. Suppl. 596. 1861.

附生攀援植物。茎粗4—5毫米，节间伸长，长2.5厘米，上部者甚短缩；节上生肉质气生根，长1—2厘米。叶柄长10—15厘米，叶鞘几达叶柄顶端，长9—14厘米，展开，宽达10毫米，大部分早落，仅沿叶柄的少部分宿存；叶片干时淡褐色、纸质，长圆状披针形，全缘，长15—20厘米，宽5—8厘米，极不等侧，常一侧比他侧宽1/2，先端渐尖，常具芒状尖头，基部钝或微心形；侧脉7—8对，基部沿中脉下延，其间有2—3条II级侧脉，网结。花序腋生和顶生；序柄长10—15厘米，从鞘状苞片中伸出；苞片线形，长约7厘米，先端渐尖，具长5—7毫米的线状尖头。佛焰苞席卷近圆柱形，展开为卵状披针形，长3—6厘米，两端强度变狭，先端有长1—1.5厘米的喙。肉穗花序具长5—8毫米的梗，粉绿色，长3—3.5厘米，两头渐狭；花密，花被环状，高为子房的1/2或稍多；雄蕊4，花丝基部宽，花药外向，药室卵形，先端与子房平齐；子房倒圆锥形，顶端宽3毫米；柱头横切，长圆形。浆果卵圆形，长8毫米，顶部平截。花果期6—10月。

产广东海南、云南东南部，海拔500米以下，附生于林内树干或石上。越南、老挝、泰国、马来西亚、新加坡、印度尼西亚(至苏拉威西岛)也有。

2. 宽叶上树南星

Anadendrum latifolium Hook. f., Fl. Brit. Ind. 6: 540. 1893; Engl. in Engl., Pflanzenr. 21 (4, 23B): 49. 1905; Ridl., Fl. Malay Penins. 5: 115. 1925; Gagn. in Lecte., Fl. Gén. Indo-Chine 6: 1093, fig. 103; 1—4. 1942 ('*Anaden-dron*').

附生攀援植物，高0.4—3米。茎粗4—5毫米，节间长1.5—3厘米，气生根肉质，较粗，长可达4—5厘米。叶柄长11—17厘米，基部扩展，具狭鞘，鞘宽5—7毫米。花序无苞片，沿叶鞘伸出，序柄长达25厘米。佛焰苞纺锤形，长5—6厘米，展开为披针形，渐尖，基部狭。肉穗花序圆柱形，长3—5.8厘米(云南标本)，有长达2厘米的梗。花极密，上面四角形或菱形，花被环状，高为子房之半；雄蕊4，交叉对生；花丝基部宽，药室基部叉开，长约1毫米，顶端开裂；子房倒圆锥形，顶部宽3毫米，柱头横线形，稍突起。浆果黄绿色，干时黑色，卵圆形，顶部几截平，长约10毫米。花果期4—5月。

产云南东南部，海拔100—250米，生于林下荫处。越南至马来半岛有分布。

11. 麒麟叶属——*Epipremnum* Schott

Schott in Bonpl. 5: 45. 1857.

藤本植物，常攀登于石上或树上。叶大，全缘或羽状分裂，沿中肋两侧常有小孔，叶柄具鞘，上端有关节。花序柄粗壮，佛焰苞卵形，多少渐尖。肉穗花序无柄，全部具花。花两

性,或稀下部为雌花,极稀单性,无花被。雄蕊4(—6);花丝线形,宽,渐狭为细长的药隔,花药远短于花丝,药室线状椭圆形,锐尖,高出药隔,外向纵裂;子房顶部截平,多边形,1室,胚珠2—4,着生于侧膜胎座的基部,稀6—8个二列于侧膜胎座上,倒生,珠孔朝向基底;珠柄短;花柱缺,柱头线状长圆形,纵向。浆果小,种子肾形,单1者稍圆,多数者有棱,种皮厚,壳状,胚弯曲。

26种,分布于印度至马来西亚。我国台湾、华南和西南有3种。

本属植物外形和分布区与崖角藤属 *Rhaphidophora* 相似,但子房1室,胚珠2—4(—8),种子肾形,是为原则上的分异。

分 种 检 索 表

1. 叶片绿色,无斑块。

2. 花单性;叶片基部宽钝,非心形,长40厘米,宽25厘米,叶片或裂片无穿孔 1. 台湾麒麟叶 *E. formosanum* Hayata

2. 花两性;叶片基部心形,长45—60厘米,宽30—40厘米,沿中肋有星散小穿孔 2. 麒麟叶 *E. pinnatum* (L.) Schott

1. 叶片翠绿色,饰以不规则的纯黄色斑块,全缘,基部深心形 3. 绿萝 *E. aureum* (Linden et André) Bunting

1. 台湾麒麟叶

Epipremnum formosanum Hayata, Icon. Pl. Formos. 5: 239, fig. 85.

1915.

附生植物,匍匐于石上或树干上。根茎匍匐,粗1厘米,光滑,干时有许多纵皱和细斑痕;叶柄痕明显,倒三角形或横新月形,宽2厘米,高8毫米。叶柄长30厘米,半圆柱形,腹面平坦或内凹,背面圆形隆起,基部扩大,扩展部分三角形,长13毫米,基宽2毫米,叶片膜质,轮廓长圆形,倒卵状或卵状长圆形,长40厘米,宽25—30厘米,先端锐尖或渐尖,基部宽钝非心形,羽状分裂,下部裂片间弯缺与中肋相距2.5厘米,裂片6—10对,顶生裂片梯形,先端骤狭锐尖或渐尖,中部侧裂片线状三角形,多少镰状,长约18厘米,基部宽3.5厘米,先端渐狭渐尖;中部侧脉与中肋交成 40° — 50° 锐角,细脉明显,网状。花序柄单生叶腋,长约15厘米,粗8毫米。佛焰苞厚,席卷,先端锐尖,长13厘米。肉穗花序单性,圆柱形,长11厘米,粗2厘米,先端钝圆,向下多少变粗。雄花极密,通常有雄蕊6,成熟时外弯,花丝扁平,牢贴于不育子房上,宽1毫米,长度不一,变黑色,先端渐狭,花药卵状线形,长2.5毫米,基部宽1毫米;不育子房倒圆锥状圆柱形,横切面为六角形,长4—3毫米,宽4毫米,顶端截平,中央有线形脐状凸起。花期7月。

我国台湾省特有。生于海拔1500米的林内。

2. 麒麟叶(海南) 百宿蕉(广东阳春),上树龙、百足藤、飞来凤(广东高要),爬树龙(海南),飞天蜈蚣(广西博白) 图版4: 1—7