

Epipremnum pinnatum (L.) Engl. in Engl., Pflanzenr. 37 (4, 23B): 60, taf. 1, fig. 25. 1908; Merr. in Lingn. Sci. Journ. 5: 43. 1927, 广州植物志: 694. 1956.——*Pothos pinnata* L., Spec. Pl. ed. 2: 1374. 1763.——*Scindapsus pinnatus* Schott, Melet. 1: 21. 1832, Kunth, Enum. Pl. 3: 63. 1841.——*Raphidophora pinnata* Schott in Bonpl. 5: 45. 1857.——*Epipremnum mirabile* Schott, Gen. Aroid. t. 79. 1858, Engl. in DC., Monogr. Phan. 2: 250. 1879, Hook. f., Fl. Brit. Ind. 6: 549. 1893, N. E. Brown in Journ. Linn. Soc. Bot. 36: 186. 1903.

藤本植物,攀援极高。茎圆柱形,粗壮,下部粗2.5—4厘米,多分枝;气生根具发达的皮孔,平伸,紧贴于树皮或石面上。叶柄长25—40厘米,上部有长2.2厘米的膨大关节;叶鞘膜质,上达关节部位,逐渐撕裂,脱落;叶片薄革质,幼叶狭披针形或披针状长圆形,基部浅心形,成熟叶宽的长圆形,基部宽心形,沿中肋有2行星散的、有时为长达2毫米的小穿孔,叶片长40—60厘米,宽30—40厘米,两侧不等地羽状深裂,裂片线形,基部和顶端等宽或略狭,裂片宽5—7.5厘米,狭长渐尖,裂片上有叶片的I级侧脉1—3条,II级侧脉与I级侧脉成极小的锐角,后逐渐与之平行。花序柄圆柱形,粗壮,长10—14厘米,基部有鞘状鳞叶包围。佛焰苞外面绿色,内面黄色,长10—12厘米,渐尖。肉穗花序圆柱形,钝,长约10厘米,粗3厘米。雌蕊具棱,长5—6毫米,顶平,柱头无柄,线形,纵向;胚珠2—4,着生于胎座的近基部。种子肾形,稍光滑。花期4—5月。

产台湾、广东、广西、云南的热带地域,附生于热带雨林的大树上或岩壁上。福建等省有栽培。自印度、马来半岛至菲律宾、太平洋诸岛和大洋洲都有分布。

茎叶供药用,能消肿止痛;可治跌打损伤、风湿关节、痈肿疮毒。

3. 绿萝(广州植物志)

Epipremnum aureum (Linden et André) Bunting Ann. Missouri Bot. Gard. 1:28. 1964.——*Rhaphidophora aurea* (Linden et André) Birdsey in Bailey 10: 155. 1962; S. Y. Hu in Dansk Bot. Arkiv 23 (4): 421. 1968.——*Pothos aurea* Lind. et André in Ill. Hort. 69, t. 381. 1880.——*Scindapsus aureus* (Lind. et André) Engl. et Krause in Engl., Pflanzenr. 37 (4, 23B): 80. 1908; 广州植物志: 694. 1956.

高大藤本,茎攀援,节间具纵槽;多分枝,枝悬垂。幼枝鞭状,细长,粗3—4毫米,节间长15—20厘米;叶柄长8—10厘米,两侧具鞘达顶部;鞘革质,宿存,下部每侧宽近1厘米,向上渐狭;下部叶片大,长5—10厘米,上部的长6—8厘米,纸质,宽卵形,短渐尖,基部心形,宽6.5厘米。成熟枝上叶柄粗壮,长30—40厘米,基部稍扩大,上部关节长2.5—3厘米、稍肥厚,腹面具宽槽,叶鞘长,叶片薄革质,翠绿色,通常(特别是叶面)有多数不规则的纯黄色斑块,全缘,不等侧的卵形或卵状长圆形,先端短渐尖,基部深心形,长32—45厘米,宽24—36厘米, I级侧脉8—9对,稍粗,两面略隆起,与强劲的中肋成70°—80°

(—90°) 锐角, 其间 II 级侧脉较纤细, 细脉微弱, 与 I、II 级侧脉网结。

广东、福建、上海栽培。原产所罗门群岛, 现广植亚洲各热带地区。

本种不易开花, 但易于无性繁殖, 附生于墙壁或山石上, 极为美丽, 亦作荫棚悬挂植物, 折枝插瓶, 经久不萎。但栽植于过于阴暗场所, 叶片上美艳的斑块则易于消失。

12. 藤芋属——*Scindapsus* Schott

Schott, Melet. 1: 2. 1832.

藤本植物, 以气生根攀援。茎常粗壮。叶柄长, 具鞘, 上部有关节; 叶片长圆状披针形、卵状披针形或卵形, 渐尖。I、II、III 级侧脉近等粗, 从中肋外伸, 几平行, 弧曲上升。花序柄短。佛焰苞舟状, 展开, 脱落。肉穗花序多少具梗, 圆柱状, 略短于佛焰苞。花密, 两性, 无花被, 雄蕊 4, 花丝宽, 先端渐狭为细尖的药隔, 花药 2 室, 子房近 4 边形, 倒金字塔形或角柱状, 顶部平, 1 室, 1 胚珠; 胚珠倒生, 株柄短, 生于室腔的基底; 柱头无柄, 圆形或椭圆形, 纵长。浆果较大, 紧靠, 成熟时革质, 垂直组织与果盖分离, 多浆, 种子 1, 圆形、近肾形、扁圆形, 基着; 种皮稍厚, 散布小疣; 无胚乳, 胚马蹄形。

约 40 种。分布于印度至马来西亚。我国海南产 1 种。

1. 海南藤芋 吊头藤、吊东根藤(海南) 图版 5

Scindapsus maclurei (Merr.) Merr. et Metc. in Lingn. Sci. Journ. 21: 5. 1945; S. Y. Hu in Dansk Bot. Arkiv 23 (4): 420. 1968.——*Rhaphidophora maclurei* Merr. in Philip. Journ. Sci. 21: 337. 1922, in Lingn. Sci. Journ. 5: 42. 1927.——*Scindapsus megaphyllus* Merr. in Lingn. Sci. Journ. 9: 36. 1930.

藤本植物, 攀援高约 10 米。茎粗壮, 上部粗达 2.5 厘米。叶二列, 密, 叶柄覆瓦状排列有如鸢尾, 长 26—32 厘米, 上部粗约 1 厘米, 基部扩大, 展开宽可达 4 厘米, 对折抱茎, 具鞘几达顶部。叶片革质, 全缘, 长圆状卵形或卵状椭圆形, 长 23—46 厘米, 宽 12—24 厘米, 锐尖或短渐尖, 基部心形或圆形, 稍不等侧, 上面深绿色, 背面浅绿色, 干时淡褐色, 侧脉极多数, 平行, 纤细, 背面稍隆起, 与中肋呈 70°—80° 锐角, 至边缘弧曲上升, 脉距 1—2 毫米。佛焰苞杏黄色, 革质, 披针形, 渐尖, 蕾时席卷, 长 18—22 厘米。肉穗花序圆柱形, 干后长约 15 厘米, 粗 2.5 厘米, 无梗; 花丝长 4 毫米, 花药卵圆形, 长 3 毫米, 不外露。未成熟浆果倒金字塔形, 具棱, 顶平, 长 9 毫米, 粗 5 毫米, 1 室, 内有种子 1。花期 11—12 月, 果于翌年花期成熟。

产海南各地, 海拔 400—600 米, 生于热带密林中的石壁或大树上。越南、泰国也有。模式标本采自海南五指山。

13. 崖角藤属——*Rhaphidophora* Hassk.

Hassk. in Flora 25 (2): Beibl. 11. 1842.