

的2张,其中1张从香港购买,另1张取自上海;由此, Brown 认为,这种植物在中国不是野生的,而是引种栽培的。解放以来,随着野生资源植物的大量调查和研究,特别是近年来中草药运动的深入和普及,积累了许多宝贵的资料,根据大量的标本可以断定,广东万年青在我国主要分布于广西各地及其邻近地区,为常绿阔叶林下较常见的阴性植物,同时,在广东等地也有较长久的栽培历史。

2. Merrill (in Ling. Sci. Journ. 6: 274. 1928) 报道本种在广东海南岛的分布是错误的,他所引证的唯一标本是曾怀德 15871 (采集号 372), 1927 年 8 月 6 日采自海南临高县莲花山,当地名“万年青草”,该标本花叶齐全(同号分别藏于中国科学院广东省植物所、中国科学院植物所、中山大学、中国科学院云南植物所),其特征属落檐 *Schismatoglottis hainanensis* H. Li。迄今为止,在海南岛未曾采到广东万年青属标本。Gagnepain (in Lecte., Fl. Gén. Indo-Chine 6: 1121. 1942) 所记述的海南分布,显然是根据 Merrill 的错误报道。

2. 越南万年青 万年青、观音莲(云南河口) 图版 8: 7—11


Aglaonema tenuipes Engl. Bot. Tidsskr. 24:275. 1902 et in Engl., Pflanzenr. 64(4, 23Dc): 24. 1915; Gagn. in Lecte., Fl. Gén. Indo-Chine 6: 1123. 1942.——*A. pierreanum* Engl. in Engl. L. C. 24, fig. 8.

多年生常绿草本,高 40—80 厘米。茎深绿色,圆柱形,光滑,粗 1—2 厘米,直立或上升;节间长 2—3 厘米,上部的较短缩,长 0.5—1 厘米;下部节上生肉质须根。鳞叶宽线形,长 4—7 厘米,骤尖,早落。叶在茎上部多密集,一般 5—6 叶;叶柄长 6—15 厘米,绿色,下部 2—6 厘米具宽鞘,上部略呈圆柱形,粗 2—3 毫米;叶片芽时席卷,卵状长圆形,长 10—25 厘米,宽 5.5—11 厘米,先端尾状渐尖,或骤狭长渐尖,基部截圆形、微心形,稍稍下延;表面深绿色,背面淡绿色,纸质;中肋明显二面隆起,Ⅰ级侧脉 6—8 对,弧曲上升,其间Ⅱ、Ⅲ级侧脉 3—10 条,细脉横生。花序 1—2,直立。花序柄长 2—6 厘米,绿色。佛焰苞长 3—4.5 厘米,蕾时纺锤形,粗 1.3 厘米,展开为卵形,舟状。肉穗花序长 2.5—4.5 厘米,比佛焰苞稍长或近等长,粗 0.9—1.1 厘米,先端稍狭,钝;下部雌花序长 5 毫米,雄花序长 2—3 厘米。雄花有雄蕊 4,花药 2 室,短,顶部截平,钝四角形,宽约 1 毫米。子房球形,宽 2 毫米,布以微小的灰白色疣点,无花柱;柱头盘状,环形,直径 1.5 毫米,1 室,基底胎座。果成熟时长圆形,长 1.2—1.8 厘米,直径 7—10 毫米,种子长圆形。花期 4—6 月,果 9—10 月成熟。

产云南西部、南部至东南部,海拔 1500 米以下,河谷、箐沟密林下较常见。老挝、越南、泰国也有。

茎入药,国外用于导泻。

与前述广东万年青在营养期和果期难于区别,唯花期肉穗花序比佛焰苞稍长或等长,常稍出露于佛焰苞外,而广东万年青肉穗花序长仅及佛焰苞 2/3,借此可以区别。



1—6. 千年健 *Homalomena occulta* (Lour.) Schott: 1. 植株, 2. 佛焰花序, 3. 幼果放大, 4. 种子, 5. 子房纵剖, 6. 子房和假雄蕊。7—11. 越南万年青 *Aglaonema tenuipes* Engl.: 7. 植株, 8. 佛焰花序, 9. 雄花顶面观, 10. 子房纵剖, 11. 果序。(肖 溶绘)