

米。雄蕊分离,密集,无柄,扁,长 1.5 毫米,宽 1 毫米,先端截平,花药 2 室。 花期 3 月。
我国特有,产台湾,模式标本采自基隆。标本未见。

3. 海南千年健

Homalomena hainanensis H. Li, 植物分类学报 15(2): 103, 图版 5:3. 1977.

多年生草本,丛生,茎直立,高 40 厘米,粗 1.2 厘米。叶柄长 46 厘米,下部 10—12 厘米具鞘;叶片绿色,卵状长圆形,长 18 厘米,宽 11—12 厘米,骤狭锐尖,具长 2—3 毫米的筒状尖头,基部阔圆形, I 级侧脉 5—6 对, II 级侧脉极多数,平行。花序柄纤细,直立,长 4—5 厘米,粗 1—2 毫米。佛焰苞黄绿色,小,舟状,长 3.5 厘米,直径 1.2 厘米,先端有长 3—4 毫米的喙。肉穗花序比佛焰苞短,长 2.5 厘米;雌花序圆柱状,长 1 厘米,粗 3 毫米;雄花序棒状,长 2 厘米,下部粗 1.5 毫米,上部粗 3 毫米,先端钝圆,子房卵圆形,柱头圆形,近无柄。 花期 10 月。

我国特有,产广东海南,生长于山坑疏林中。模式标本采自保亭。

本种与国产其它种的区别是叶片基部宽圆形而非心形;佛焰苞细小,长 3.5 厘米;肉穗花序长 2.5 厘米;雄花序棒状,长 2 厘米,上部粗 3 毫米。

18. 落檐属——*Schismatoglottis* Zoll. et Mor.

Zoll. et Mor., Syst. Verz. 83. 1854.

草本。根茎匍匐或具地上茎。叶柄远长于叶片,下部具鞘,先于花序的叶柄具长鞘;叶片纸质(用放大镜观察常有细密的网状窝孔,表面有稀疏的偶为银白色的透明点),表面绿色,具粉绿色或黄色斑块或否,背面苍白色至粉绿色,披针形,心形或箭形, II、III 级侧脉与 I 级侧脉平行,或部分与后者相交成狭的锐角,均于近边缘连成集合脉。花序柄短于叶柄。佛焰苞管部席卷、宿存;檐部较狭,席卷,由其基部环状脱落。肉穗花序短于佛焰苞;雌雄同序:雌花序下部一侧与佛焰苞合生,有时基部具中性器官;雄花序紧接雌花序或相间(间隔短,近裸秃或具稀疏的中性花),棒状,下部能育,上部为中性花。花单性:能育雄花有雄蕊 2—3,雄蕊短、扁、近楔形,顶部截平,药隔厚,药室对生,室孔卵形或 2 裂,花粉粉末状;不育雄花的假雄蕊比能育雄蕊小、扁,倒圆锥状或棒状。雌花有心皮 2—4;子房稀具 1—4 个假雄蕊, 1 室,有侧膜胎座 2—4;胚珠多数,倒生至半倒生,珠柄长,珠孔向下;花柱不存在或短,柱头盘状。浆果长圆形;种子多数,短椭圆状,具纵肋。

100 种。分布于马来西亚的马来亚地区。我国广东、广西各有 1 种,台湾栽培 1 种。

分 种 检 索 表

1. 叶片纯一色,无斑块。

2. 叶片椭圆形,披针形、长圆形,基部圆形或钝尖;佛焰苞长 7 厘米;肉穗花序短小,长 5 厘米……………

…………… 1. 落檐 *S. hainanensis* H. Li