

纸质，表面深绿、背面淡绿色、密布小窝点，长圆形，先端锐尖，基部深心形，长15—20厘米，宽8—10厘米，后裂片半卵形，长3—4厘米，相交成直角或锐角，侧脉10对，下部2—3对基出。花序柄长40厘米。佛焰苞绿色，长12—15厘米；管部长5—7厘米，纺锤形，粗1.5—2厘米，多少一侧肿胀；檐部卷成角状，长7—8厘米，粗7—12毫米，后期张开。肉穗花序(广西标本)：雌花序长约3.4厘米，粗1.4厘米，背面2/3与佛焰苞管部合生，雌蕊间星散少数不育雄花，腹面中部以上有大片密集的不育雄花，雌花在此散生；紧接的能育雄花序长3—3.5厘米，粗5—6毫米，向上过渡为长4—6厘米长的圆柱形中性花序。雌蕊倒圆锥形，顶部扁平，柱头盘状。雄花有雄蕊2，顶部扁平，轮廓长圆形或肾形，药室对生，顶孔开裂；假雄蕊棒状，钝。花期6月。

产广西龙州，海拔740—880米，生长于热带密林下或石上。分布于东南亚至太平洋诸岛。

茎入药，据说可治体弱、腰骨痛，有肥儿作用(广西)。

3. 巴布亚落檐

Schismatoglottis novo-guineensis (André) N. E. Brown in Gard. Chron. 24:776. 1885; Engl. et Krause in Engl., Pflanzenr. 55(4, 23Da): 113. 1912; 正宗严敬，最新台湾植物总目录：261. 1936.——*Colocasia neoguineensis* André* in Illustr. Hortic. 27: 68, t. 380. 1880.

大型草本，具地下茎。叶柄为叶片长的2倍，绿色或紫色，1/4—1/5具鞘；叶片薄，表面亮绿色，有苍白色、白色或黄色的、不规则多角形的斑块，卵状心形，短渐尖，有长4—5毫米的圆柱形尖头，长12—25厘米，宽7—16厘米，后裂片半卵形，相交几成直角，长为前裂片1/6—1/4。花序柄长6厘米。佛焰苞管部绿色、伸长，长2.5—3厘米，粗9—7毫米；檐部长圆形，长约4厘米，宽2厘米，白色，有长6—7毫米的尖头。肉穗花序中雌花序长约1.5厘米，粗4—5毫米；能育雄花序紧接，陀螺状，长约1厘米；上部中性花序半卵形，长几达1厘米，粗7—8毫米，橙黄色。雄蕊花药倒卵形，顶孔2裂，花丝短。假雄蕊棒状。子房长圆形，胎座1—3，柱头盘状。

我国台湾省园庭中栽培供观赏。原产巴布亚新几内亚的巴布亚。

9. 花叶万年青族——Trib. Dieffenbachieae Engl.

Engl. in DC., Monogr. Phan. 2: 71. 1879.

矮小亚灌木，直立，肉佛花序与佛焰苞分离，无附属器。花单性，无花被，雄花雄蕊合生成1体。雌花具假雄蕊。

11属，我国不产，仅有栽培1属。

* 原著未见，Index Kewensis 记载为 *Colocasia neoguineensis* André in Illustr. Hortic. 27: 68. 1880, 但 Engler et Krause in Engl., Pflanzenr. 55 (4, 23Da): 113. 1912 作 *C. neo-guineensis* Hort. Lind., 而在本种拉丁正名中写作 *Schismatoglottis novo-guineensis* (Linden) N. E. Brown.