

2. 花叶万年青

Dieffenbachia picta (Lodd.) Schott Bunting in Bailey 10:145. 1963.——*Caladium maculatum* Lodd. in Bot. Cabin. no. 608. 1822.——*Dieffenbachia picta* (Lodd.) Schott in Österr. Bot. Wochenbl. 68. 1852; Engl. in Engl., Pflanzenr. 64 (4, 23Dc): 48, fig. 20; N—S, fig. 21; A—H. 1915; 广州植物志: 690. 1956.——*Caladium pictum* Lodd., Bot. Cab. t. 608. 1822.

茎高1米,粗1.5—2.5厘米,节间长2—4厘米;下部的叶柄具长鞘,中部的叶柄达中部具鞘,上部叶柄长,鞘几达顶端,有宽槽;叶片长圆形、长圆状椭圆形或长圆状披针形,长15—30厘米,宽7—12厘米,基部圆形或锐尖,先端稍狭具锐尖头,二面暗绿色,发亮,脉间有许多大小不同的长圆形或线状长圆形斑块,斑块白色或黄绿色,不整齐; I级侧脉15—20对,上举, II级侧脉较纤细,背面隆起。花序柄短。佛焰苞长圆披针形,狭长,骤尖。肉穗花序:下部雌花序达中部;不育中性花序占全长1/3,花星散;子房心皮2或3,柱头近分离。浆果橙黄绿色,2—3室。

广东、福建各热带城市普遍栽培,也有逸生的。原产南美。

3. 白斑万年青

Dieffenbachia bowmannii Carr. in Revue Hortic. 199. 1872; Engl. in Engl., Pflanzenr. 64 (4, 23Dc): 52, fig. 17; H. 1915; 正宗严敬,最新台湾植物总目录: 261. 1936.

粗壮草本,从基部分枝。茎高1米,粗1.5—4厘米。叶柄约为叶片长的1/3,有时仅1/4—1/5,下部具鞘,上部有深槽;叶片膜质,表面暗绿色,有苍白色斑块,不发亮;背面绿色,不发亮,长圆状卵形,长30—40厘米,宽15—20厘米,基部钝或略突出,先端短渐尖;中肋下部宽2毫米, I级侧脉14—16对,与中肋呈45°锐角伸出,近边缘上升,背面明显隆起。花序柄大都与鳞叶等长,长8—10厘米。佛焰苞绿色,长15—18厘米,席卷,中部稍收缩,管部宽1.5厘米,上部展开,披针形,渐尖。肉穗花序无柄:雌花序长5—6厘米,雄花序长5—6厘米,其间间隔细,散布中性花。雌花子房扁球形,2室,柱头粗,2裂;假雄蕊3—5,短,倒卵形,多少粘合。雄花:雄蕊合生,浅黄色,宽2.5毫米。

我国台湾省栽培供观赏。原产南美。

4. 白肋万年青

Dieffenbachia leopoldii Bull., Catal. 4. 1878; Engl. in Engl., Pflanzenr. 64 (4, 23Dc): 57, fig. 24; J.-R. 1915; 正宗严敬:最新台湾植物总目录: 261. 1936.

茎高50厘米,粗1.5—2厘米,节间长2.5—3厘米。幼株叶柄苍绿色,具淡紫色斑块,长为叶片的1/3—1/4,至中部以上具鞘;叶片表面中肋白色,余为亮如丝绸的绿色;成熟植株叶柄长约为叶片的1/2,下半部具鞘;叶片宽椭圆形,短渐尖,长25—35厘米,宽10—19厘米;花枝上部的叶柄短,至中部具鞘,叶片卵形,基部近心形; I级侧脉18—20