

湾省雅美族至今以芋为主粮。叶柄可剥皮煮食或晒干贮用。全株为常用的猪饲料。块茎入药可治乳腺炎、口疮、痈肿疔疮、颈淋巴结核、烧烫伤、外伤出血，叶可治荨麻疹、疮疥。

本种很少开花，通常用子芋繁殖。

3. **野芋** (本草纲目拾遗) 野芋头、红芋、野山芋 (江西)，红广菜 (贵州榕江、剑河、镇远)

Colocasia antiquorum Schott, Melet. 1: 18. 1832; Kunth, Enum. Pl. 3: 37. 1841; Engl. in DC., Monogr. Phan. 2: 491. 1879; Hook. f., Fl. Brit. Ind. 6: 523. 1893, in Curtis, Bot. Mag. t. 7364. 1894; Krause in Engl., Pflanzenr. 71 (4, 23E): 65. 1920; Gagn. in Lecte., Fl. Gén. Indo-Chine 6: 1139. 1942; S. Y. Hu in Dansk Bot. Arkiv 23 (4): 428. 1968.——*Arum colocasia* L., Sp. Pl. ed. 1: 965. 1753.——*Colocasia esculentum* var. *antiquorum* (Schott) Hubbard et Rehder in Bot. Mus. Leaflet. Harvard 1 (1): 5. 1932.

湿生草本。块茎球形，有多数须根；匍匐茎常从块茎基部外伸，长或短，具小球茎。叶柄肥厚，直立，长可达 1.2 米；叶片薄革质，表面略发亮，盾状卵形，基部心形，长达 50 厘米以上；前裂片宽卵形，锐尖，长稍胜于宽，I 级侧脉 4—8 对；后裂片卵形，钝，长约为前裂片的 $\frac{1}{2}$ ， $\frac{2}{3}$ — $\frac{3}{4}$ 甚至完全联合，基部弯缺为宽钝的三角形或圆形，基脉相交成 30—40° 的锐角。花序柄比叶柄短许多。佛焰苞苍黄色，长 15—25 厘米；管部淡绿色，长圆形，为檐部长的 $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{5}$ ；檐部狭长的线状披针形，先端渐尖。肉穗花序短于佛焰苞；雌花序与不育雄花序等长，各长 2—4 厘米；能育雄花序和附属器各长 4—8 厘米。子房具极短的花柱。

产江南各省，常生长于林下阴湿处，也有栽培的。

块茎 (有毒) 供药用，外用治无名肿毒、疥疮、吊脚癣 (大腿深部脓肿)、痈肿疮毒、虫蛇咬伤、急性颈淋巴腺炎 (贵州、江西)。

本种也很少开花，营养体的特点是叶片卵形，基部裂片几全长合生；块茎圆形，有许多发亮的芽眼。

4. **紫芋** 芋头花 (指花序，云南)，广菜、东南菜 (贵州威宁)，老虎广菜 (贵州剑河) 图版 13: 4—10

Colocasia tonoi Nakai, Icon, Pl. As. Orient. 3 (3): t. 85. p. 231. 1940.——*Colocasia antiquorum* Schott f. *purpurea* Makino in Iinuma, Somoku Zusetu rev. ed. 4: 1253. 1912.

块茎粗厚，可食；侧生小球茎若干枚，倒卵形，多少具柄，表面生褐色须根，亦可食。叶 1—5，由块茎顶部抽出，高 1—1.2 米；叶柄圆柱形，向上渐细，紫褐色；叶片盾状，卵状箭形，深绿色，基部具弯缺，侧脉粗壮，边缘波状，长 40—50 厘米，宽 25—30 厘米。花序柄单 1，外露部分长约 12—15 厘米，粗 1 厘米，先端污绿色，余与叶柄同色。佛焰苞管部长