

Groff l. c. p. p., quoad specim. McClure H. 9348, field no. 2792.

块茎扁球形,厚2—8厘米,直径4.5—13厘米,顶部扁平,几不下凹,密生分枝肉质根。鳞叶多数,线形,膜质,内面的长10厘米,宽1厘米。叶柄长50—90厘米,粗1厘米,干时绿白色,饰以暗绿色小块斑点。叶片3全裂,裂片离基10厘米以上2次分叉,小裂片互生,基生小裂片椭圆形,长7—8厘米,宽3—4厘米,先端骤狭渐尖,基部楔形,一侧稍下延;顶生2个小裂片倒披针形或披针形,锐尖,基部楔形,一侧下延,长14—18厘米,宽3—6厘米,表面绿色,背面淡绿色,其下两小裂片外侧极下延,下延部分联合成长4厘米,宽2厘米的翅,侧脉弧曲上升,集合脉距叶缘3—8毫米。花序柄长23—60厘米,颜色同叶柄。佛焰苞绿色、浅绿白色,干时膜质,长卵形或椭圆形,长12—26厘米,宽14厘米,下部席卷,上部舟状展开,内面基部紫色,余黄绿色。肉穗花序短于佛焰苞,长8—19厘米,具短梗或否,雌花序长1.5—3厘米,粗1—3厘米,基部稍狭;雄花序长1.4—4.5厘米,粗1—3厘米;附属器长圆锥形或纺锤形,绿色,黄白色,长4.5—14厘米,中下部粗1.5—6厘米,中部以上渐狭,先端钝圆。花药无柄,圆柱形,长1毫米;子房倒卵形,长1—2.5毫米,先端渐狭为长0.3—0.5毫米的花柱,柱头盘状,微2—3—4—浅裂。浆果蓝色,种子黑色。花期3—4月,果7—8月成熟。

产湖南、广西、广东及沿海岛屿、云南东南部,生于海拔220—800米的林下。模式标本采自香港。

本种与滇磨芋 *A. yunnanensis* 的区别为:本种肉穗花序长为佛焰苞长的3/4,附属器长4.5—14厘米;滇磨芋肉穗花序为佛焰苞长的1/3—1/2,附属器长仅3.8—5厘米,粗1.2—2.3厘米。

11. 梗序磨芋

Amorphophallus stipitatus Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin. 8: 457. 1923.

块茎球形。叶柄光滑,浅绿色,有深绿色斑块,粗约1厘米,长30厘米;叶片3裂,I次裂片长30厘米,二歧分裂,II次裂片羽状分裂,最后的裂片互生,上部的长披针形,长10—15厘米,中部宽3—4厘米,长渐尖,不等侧,外侧下延2—4厘米,集合脉距边缘2—3毫米;下部的裂片长圆形,长5厘米,最下部的披针形,长4厘米,宽1厘米,花序柄长约3.5厘米,淡绿色,具橄榄绿色斑块。佛焰苞长于肉穗花序,长圆形,长12厘米,宽4—4.5厘米,稍内凹,下部席卷,苍白色,内面下半部青紫色。肉穗花序具长达2厘米的梗;雌花序倒圆锥形,长1.5厘米;雄花序圆柱形,长2厘米;附属器圆锥状,长5厘米,下部粗1.25厘米,苍白色。雄蕊顶部近四边形,黄色。子房暗青紫色,长2.5—3毫米,近球形,直径1.2—1.5毫米;花柱与子房等长,柱头柱状,稍浅裂。

我国特有,产广东省。标本未见。

12. 蛇枪头(广西) 土南星(广西武鸣),七角莲(金秀),蛇春头、蛇蒜头(广东) 图