

港。

2. 线花南星

Arisaema matsudai Hayata, Icon. Pl. Formos. 9: 149, fig. 55. 1920.

叶1, 叶柄长35—40厘米, 下部10—15厘米鞘状。叶片3全裂, 裂片近无柄, 膜质, 中裂片卵状长圆形, 长13厘米, 宽5—6厘米, 锐尖, 具短的芒状尖头, 基部宽楔形或钝, 全缘, 侧脉间细脉网状; 侧裂片无柄, 与中裂片同形, 但基部偏斜, 多少钝圆。花序柄与叶柄近等长。佛焰苞长7—8厘米, 管部圆柱形, 长3厘米, 粗1厘米, 向上稍扩大, 喉部边缘斜截形; 檐部披针形, 长3厘米, 宽1.5厘米, 先端渐尖。肉穗花序单性, 雄花序长1.5厘米, 雄花有雄蕊3, 花药2室, 药室球形, 顶孔开裂; 附属器线形, 长2.5厘米, 上部具毛状中性花。花期4月。

我国台湾省特有。

3. 滇南星 图版22: 1—2

Arisaema austro-yunnanense H. Li, 植物分类学报 15 (2): 105, 图版 9: 1(1—2). 1977.

多年生草本。雌雄异株。鳞叶绿褐色, 管状, 先端锐尖。叶1, 叶柄绿褐色, 除上部6厘米外鞘状; 叶片3全裂, 裂片表面深绿色, 背面白绿色, 中裂片具长1.5厘米的柄, 卵状长圆形, 长8厘米, 宽6厘米, 骤狭渐尖, 基部钝, 侧裂片具长5毫米的柄, 卵状披针形, 长9—10厘米, 宽4.8—5厘米, 渐尖, 基部斜圆形, 不等侧; 侧脉约10对, 与中肋背面隆起, 表面不明显, 网脉极细弱。花序柄与叶柄近等长, 纤细。佛焰苞小, 长6.5厘米; 管部漏斗形, 长约2.8厘米, 上部宽1厘米, 淡绿色, 喉部边缘不反卷, 几截平, 略收缩; 檐部卵状披针形, 长3厘米, 宽1.5厘米, 渐尖, 有2—3毫米长的芒状尖头, 深绿色, 直立, 基部有一段高5毫米的绿白色横带。肉穗花序单性, 雄花序近圆柱形, 长1.5厘米, 基部粗3毫米, 向上渐细, 花疏, 雄花近无柄, 花药2—4, 药室圆球形, 顶孔横裂; 附属器纤细, 长2.2厘米, 直立, 伸出喉外约1厘米, 上下部都有极稀疏的长不及1毫米的钻形中性花。花期5月。

我国云南特有, 产景洪县小勐养, 海拔780米。

本种叶1, 佛焰苞有白色横带, 药室顶孔横裂, 中性花极疏且短, 与画笔南星 *A. penicillatum* 显然不同。

4. 二色南星

Arisaema grapsospadix Hayata, Icon. Pl. Formos. 5: 244, t. 17. 1905; Kitam. in Tokyo Bot. Mag. 10: 186. 1941. — *A. quinquefoliola* Hayata, Icon. Pl. Formos. 9: 146, t. 7. 1920.

根茎卵状长圆形, 长4—5厘米, 直径2—2.5厘米, 多少弯曲; 根线形, 满布, 稍分枝。叶2—3, 鳞叶2—3; 叶柄等长或否, 具鞘部分长30—35厘米, 鞘撕裂, 先端钝圆, 无鞘部分圆柱形, 长11厘米; 叶裂片3(—5), 中裂片具长2.5厘米的柄, 长圆形或长圆披针形,