

采自广西凌乐。

本种与翼檐南星 *A. griffithii* 的差别在于：1. 附属器下部近圆柱形或长圆锥形，基部渐狭为柄，光滑，基部非截形，亦不盘状扩大；2. 柱头有短柄，圆盘状，子房有胚珠 2 而非多数；3. 叶 1，花后抽出。

块茎入药，据称治毒蛇咬伤。

33. 会泽南星

Arisaema dahaiense H. Li, 植物分类学报 15 (2): 107, 图版 9:3. 1977.

多年生草本。根茎横生，卵状圆锥形，长 9 厘米，粗 5 厘米，周围常有数个芽眼凸起，颈部密生长达 20 厘米的肉质根，尾部于新苗抽出后逐年溃烂。鳞叶 2，膜质，披针形，长 10—20 厘米，下部环抱叶柄，基部宽 10 厘米，稻黄色，具多数淡黄色纵脉，内面一枚纵脉间有白色斑点。叶 1 或 2，叶柄淡绿色，光滑，无斑块，圆柱形，基部 6 厘米长具鞘口，如有 2 叶，则第二叶于花后抽出，叶柄长 45 厘米，基部粗达 3 厘米，向上渐细；叶片 3 全裂，裂片具长 2 厘米的柄，表面暗绿色，背面淡绿色，饰以一线紫红色的边缘；中肋淡绿色，表面下凹，背面强裂隆起，粗达 2 毫米，侧脉 8—10 条，背面淡绿色，隆起，II 级侧脉明显，较细，网脉明显，集合脉 3 圈，内圈距边缘 1—2 厘米；中裂片卵形，远比侧裂片小，长 18 厘米，宽 16 厘米，渐尖，基部圆形；侧裂片斜椭圆形，长 25 厘米，宽 18 厘米，基部内侧楔形，外侧宽耳状，圆形，宽为内侧的 2—3 倍；芽时中裂片和 1 侧裂片朝上，第二侧裂片朝下。花序柄长约 20 厘米，圆柱形，下部淡绿色，中部以上变紫色。佛焰苞管部圆筒形，长 6 厘米，粗 2—3 厘米，紫色，具绿白色纵条纹；檐部长约 22 厘米，盔状下弯，宽约 15 厘米，深紫色与绿白色条纹相间，盔顶以绿白色条纹为主，两侧从喉部开始翼状扩展，翼缘明显反卷，与前檐均为深紫色具黄绿色网纹；前檐几呈正方形，中间具约 1 厘米的喙尖。肉穗花序两性和单性，两性花序以雄花为主，基部有 2 轮能育子房，其雄花序长 3.5 厘米，连花粗 1.5 厘米，花序轴和雄花梗深紫色，花疏，雄花梗长 2—3 毫米，药室 4，圆形，马蹄形开裂，花粉黄色；附属器暗紫色，光滑，长约 30 厘米，基部具长约 5 毫米的柄，近截平，粗 1.5 厘米，向上渐狭为长圆锥形，至 7—8 厘米之后渐狭成线尾，下垂。雌肉穗花序单性，无雄花，花序长 2.3 厘米，连花粗 1.4 厘米；附属器同两性花序，唯较短，长 15—16 厘米，子房（两性花序上的同此）长圆锥形，淡绿色，长约 2.5 毫米，粗约 1 毫米，柱头青紫色，馒头状凸起，无柄，1 室，胚珠 2，瓶状，直立，珠柄短，着生于基底胎座上。花期 5 月。

我国特有，产云南会泽，海拔 2600 米。模式标本采自会泽大海，引种于昆明植物园，能正常生长。

本种和凌云南星 *A. lingyunense* 的区别在于：花、叶同出，叶裂片饰以一线紫红色边缘，根茎卵状圆锥形而非扁球形，肉穗花序两性和雌花序单性。

151 et 199. 1920 p. p.; Hara, Fl. E. Himal. ed. 2. 325. 1971.—Sect. *Trisecta* Schott, Prodr.: 25 et 27. 1860, pro minor part.—Sect. *Ringentia* Engl., l. c. 151 et 209.—Sect. *Colocasiarum* Nakai in Journ. Jap. Bot. 25: 6. 1950.—*Ringentiarum* Nakai l. c.

叶2或1, 叶片3裂, 稀5裂。肉穗花序雌雄异株; 药室裂孔椭圆形或圆形; 附属器圆柱形, 直立, 略伸出佛焰苞喉外, 顶端钝圆, 基部近截形。

34. 驴耳南星

Arisaema onoticum Buchet in Lect., Not. Syst. 1 (12): 374. 1911; Engl. in Engl., Pflanzenr. 73 (4, 23F): 201. 1920.

块茎近球形, 直径2—3厘米。鳞叶上部狭, 锐尖, 下部长鞘状, 上部的长20厘米。叶1—2, 叶柄长18—33厘米, 粗1.5—2.5厘米, 下部2/3具鞘, 鞘端截平; 叶片3全裂, 裂片具长1—2.5厘米的柄, 椭圆形或椭圆状披针形, 长9—11厘米, 宽约4厘米, 具细齿, 基部楔形, 对称, 先端渐尖, I级侧脉纤细, 与中肋几成直角, 集合脉清晰。花序柄与叶柄近等长, 略短或稍长, 粗2.5—3毫米。佛焰苞全长9—11厘米, 中部具白色条纹, 上半部褐紫色, 稀绿色, 管部苍白色, 漏斗状, 长约5厘米, 上部粗1.5—2厘米, 喉部边缘斜截形, 不反卷; 檐部直立, 驴耳状, 背部稍囊肿, 边缘深波状, 短渐尖。肉穗花序单性, 雄花序长2—3厘米, 长圆锥形, 花多而密; 附属器长2.2—5厘米, 直立, 具长5—8毫米的柄, 基部骤然增粗, 基底截形, 上部圆柱形或倒圆锥状圆柱形, 先端粗棒状, 稍伸出喉外, 远短于檐部, 雄花具短柄, 雄蕊3—4, 药室短椭圆状, 顶孔开裂, 药隔三角形。

我国特有, 产四川城口。模式未见。

35. 花南星(四川) 蛇芋头、大麦冬、狼毒(湖北鹤丰), 蛇磨芋、天南星(湖北均县、利川、恩施), 南星七、绿南星、白南星、半边莲、虎爪南星、狗爪南星(湖北巴东), 独脚莲(广西龙胜), 虎芋(贵州兴义), 麻芋子(四川天全), 血理箭(四川武隆), 大半夏、芋儿南星(四川北川), 蛇杵棒(四川宝兴), 黑南星(四川洪雅), 南星(四川广原), 虎掌(四川洪溪), 狗爪半夏(四川黑水), 蛇包谷(四川南川), 花包谷、红包谷、大麻芋子、烂屁股(四川峨眉)。

Arisaema lobatum Engl. in Engl., Bot. Jahrb. 1: 487. 1811; Franch., Pl. David. 2: 138. 1888; N. E. Brown in Journ. Linn. Soc. Bot. 36: 178. 1903; Engl. in Engl., Pflanzenr. 73 (4, 23F): 202, fig. 46. 1920.—*A. lobatum* var. *a. rosthornianum* Engl. in Engl., Bot. Jahrb. 29: 235. 1901, 36: 11. 1905, in Engl., Pflanzenr. 73 (4, 23F): 202. 1920; N. E. Brown in Journ. Linn. Soc. Bot. 36: 178. 1903; Krause in Fedde, Rep. Sp. Nov. 12: 314. 1922; Hand.-Mazt., Symb. Sin. 7: 1366. 1936.—*A. pictum* N. E. Brown in Journ. Linn. Soc. Bot. 29: 321. 1892.—*A. lobatum* var. *b. latisectum* Engl. in Engl., Pflanzenr. 73 (4, 23F): 202. 1920.