

状,最上部毛发状,由喉外下弯,然后弧曲上升。雄花无柄,雄蕊2—3,药室卵形,顶孔开裂。花期6月。

我国特有,产云南洱源黑山门。

标本未见。原描述未载块茎形状大小,叶裂片数目,侧裂片形状,已描述部分很象岩生南星 *A. saxatile*, 唯附属器细长,长达20厘米,粗仅1.5毫米,上部毛发状。

#### 43. 短檐南星

*Arisaema brachyspathum* Hayata, Icon. Pl. Formos. 5: 241, fig. 86. 1915 (ut *A. brachyspatha*).

块茎不详。鳞叶3—4,内卷,膜质透明,上部具紫色斑点,外面的长3厘米,展开宽18毫米,先端钝圆;内面的长15厘米,先端渐尖,基部鞘状。叶1,叶柄长35厘米,具鞘部分长30厘米。叶片鸟足状分裂,裂片无柄,侧裂片间距约1厘米,长披针形,长9厘米,宽1.8厘米,先端渐尖,边缘一线紫色,具细锯齿或圆齿,向外依次渐小。花序柄略短于叶柄,长29厘米。佛焰苞近直立,长6厘米,管部长2—3厘米;檐部长3厘米,先端尾状渐尖,基部多少缢缩。肉穗花序,雄花序圆柱形,无柄,长1.5厘米,粗3.5毫米,花密;附属器近直立,外伸,长6厘米,基部粗2.5毫米,圆柱状,向上渐狭近线形,先端绿色。雄花具短柄,花药3,2室。花期4月。

我国特有,产福建。标本未见。

#### 44. 岩生南星 图版30: 4—7

*Arisaema saxatile* Buchet in Lecte., Not. Syst. 2 (4): 124. 1911; Engl. in Engl., Pflanzenr. 73 (4, 23F): 161. 1920. — *Arisaema mairei* Lévl., Cat. Pl. Yunnan: 10. 1915; Merr. in Sunyetsen. 3: 247. 1937. — *A. maireanum* Engl. in Engl., Pflanzenr. 73 (4, 23F): 161. 1920; Hand.-Mazt., Symb. Sin. 7: 1365. 1936.

块茎近球形,直径1—3厘米。鳞叶2—3,披针形,锐尖,最内的长17厘米。叶1—2,叶柄长16—40厘米,下部1/2—2/3具宽鞘,绿褐色或绿白色;叶片鸟足状分裂,裂片5—7,靠近,线形、椭圆形至卵状披针形,中裂片具长5—10毫米的短柄或否,长6—17厘米,宽1—5厘米;侧裂片近无柄,有时基部联合,长5—15厘米,宽1—3.5厘米,向外的渐小;均全缘,基部狭楔形,先端长渐尖,侧脉稀疏,近平行,斜伸,与中肋成小锐角。花序柄10—39厘米,有纵条纹。佛焰苞黄绿色,绿白色,淡黄色,长5—10厘米,管部长椭圆形或圆柱形,长2.2—3厘米,粗7—15毫米,喉部边缘无耳,斜截形;檐部近直立,椭圆状披针形至披针形,长6—7厘米,宽1.5—2厘米,渐尖。肉穗花序单性,雄花序圆柱形,长1.8—2.2厘米,粗3—4毫米,花密,雄花无柄,花药2—4,药室近球形,顶孔开裂为圆形;雌花序圆锥形,长12—20毫米,下部粗1厘米,子房绿白色,倒卵形,柱头小,盘状,具短柄,胚珠3,长圆形,浆果种子1,近球形;各附属器无柄,长4—10厘米,下部粗2.5—3毫米,近直立