

倒卵圆形,花柱长约1毫米,柱头半球状,胚珠3—4,珠柄稍长。花期2—4月,果期4—6月。

我国特有,产四川(城口、奉节、南川、峨眉、重庆)、湖北西部(利川)、贵州北部(遵义),生于海拔650—1400米的林下或湿润地。模式标本采自四川城口。

本种显著特点是附属器下部具中性花,先端为具肉质棒状突起的棒头。果期附属器常易折断,此时仍可根据其基部中性花来识别。

#### 55. 云台南星 图版33: 7—8

*Arisaema du-bois-reymondiae* Engl. in Engl., Pflanzenr. 73 (4, 23 F); 173. 1920. — *Arisaema serratum* auct. non Schott. 秦岭植物志 1 (1): 286, 图256. 1976.

块茎近球形,直径2厘米,高1.5厘米,上部密生分枝须根。鳞叶3,下部管状,上部略分离,钝,膜质,内面的长8—10厘米。叶2,叶柄绿色,长约20厘米,中部以下具鞘;叶片鸟足状分裂,裂片7—9,倒披针形或披针形,背面略呈粉绿色,中裂片具短柄,长6—7厘米,宽2—2.5厘米,侧裂片依次渐小,最外侧的长5厘米,宽1.3厘米,侧脉极细弱,斜上升,集合脉距边缘约1.5毫米。花序柄短于叶柄,长13—15厘米,高出叶柄鞘2—4厘米。佛焰苞淡白绿色,内面具3—5条白色纵条纹,全长15厘米,管部漏斗状,长5.5—6厘米,喉部宽2—2.5厘米,边缘略反卷;檐部长圆形,长7厘米,宽3—3.5厘米,锐尖,有长0.5—1厘米渐尖头。肉穗花序单性,雄花序长约2厘米,花较疏;附属器无柄,长圆柱形,略成棒状,长7厘米,中上部粗5—7毫米,下部粗2—3毫米,先端钝圆,光滑,基部约1厘米长具少数长3—5毫米的钻形中性花。雄花有雄蕊2—4,药室圆球形,顶孔圆形开裂。花期4—5月,稀至10月(江西庐山)。


我国特有,产长江中下游诸省:湖南、河南、江西、浙江、安徽、江苏,南至福建南平、广东连平,北至陕西太白山,海拔1800米以下,生于竹林内、灌丛中。模式标本产自江苏连云港。

块茎入药,外用治无名肿毒初起、面神经麻痹、毒蛇咬伤、神经性皮炎,灸后内服治肺病咳嗽(江苏)。

本种标本常被误定为 *A. japonicum* Blume, 但后者附属器明显具柄,较粗短,基部光滑无中性花。

#### 56. 狭叶南星

*Arisaema angustatum* Franch. et Sav., Enum. Pl. Jap. 2. pt. 1, p. 6. 1876, nom. nud., 2: pt. 2, p. 507. 1879; Nakai in Tokyo Bot. Mag. 42: 452. 1928, 43: 533. 1929, Icon. Pl. As. Orient. 2 (2): tab. 53: 1—2. 1937; Ohwi, Fl. Jap.: 256. 1956. — *A. angustata* Engl. in DC., Monogr. Phan. 2: 560. 1879. — *A. serratum* f. b. *Blumei* Makino in Tokyo Bot. Mag. 15: 129. 1901, p.



1—4. 黎婆花 *Arisaema hainanense* C. Y. Wu: 1. 植株, 2. 根茎的一部分, 3. 雄性肉穗花序, 4. 雄花。  
 5—6. 棒头南星 *A. clavatum* Buchet: 5. 佛焰花序, 6. 雌性肉穗花序。7—8. 云台南星 *A. du-bois-reymondiae* Engl.: 7. 佛焰花序, 8. 雄性肉穗花序。9—10. 灯台莲 *A. sikokianum* Franch. et Sav. var. *serratum* (Mak.) Hand-Mazt. 9. 植株, 10. 雄性肉穗花序。(肖 溶绘)