

形,胚珠3—6,珠孔稍宽,截平。花期5—6月。

我国特有,产四川东部城口(模式产地)。

59b. **具齿褐斑南星** 白附子(四川万源),半夏(云南镇雄)

var. *sinuatum* Buchet in Lecte., Not. Syst. 2 (4): 123. 1911; Engl. in Engl., Pflanzenr. 73 (4, 23F): 176. 1920.

叶裂片具啮状波齿,叶柄长为花序柄长的2倍;附属器内藏。

我国特有,产四川东北部(城口、万源)、云南东北部(镇雄),海拔2000—2500米,生于山坡灌丛或草地。模式标本采自四川城口后坪。

60. **猪笼南星** 图版34: 1—4

Arisaema nepenthoides (Wall.) Mart. in Flora: 458. 1831; Kunth, Enum Pl. 3: 16. 1841; Engl. in DC., Monogr. Phan. 2: 551. 1879; Hook. f. in Curtis, Bot. Mag. t. 6446. 1879, Fl. Brit. Ind. 6: 504. 1893; Engl. in Engl., Pflanzenr. 73 (4, 23F): 208, fig. 49. 1920, excl. specim. G. Forrest 4851 quod est *A. biauriculatum* W. W. Sm. ex Hand.-Mazt., Hara, Fl. E. Himal.: 395. 1966, ed. 2: 345, Pl. 18: b, fig. 54; H. 1971.——*Arum nepenthoides* Wall., Tent. Fl. Nepal. 26, t. 18. 1824.——*Arisaema ochraceum* Schott sensu Journ. Linn. Soc. Bot. 43: 483. 1916.

块茎扁球形,直径6—7厘米。叶2,稀3,叶柄长(5—)7—30厘米,黄褐色,具深暗的杂色斑块,几3/4具鞘,抱合成管状,鞘上端斜耳状;叶片掌状5(—7)裂,裂片近无柄,倒披针形,锐尖或渐尖,中裂片长16—20厘米,宽2—6厘米,侧裂片依次渐小,最外侧的15—16厘米以下,外侧基部常宽耳状;各裂片表面暗绿色,薄革质,侧脉6—12对,脉距6—8毫米,集合脉离边缘3—4毫米。花序柄从叶柄鞘中抽出,比叶柄长或短,颜色同叶柄。佛焰苞粉绿褐色或暗红褐色,有不规则的暗色斑块,具3—5(—7)条白色宽条纹;管部圆柱形,长3—8厘米,直径1.2—2.5厘米,喉部有宽耳,耳半圆形,外翻,宽达2厘米;檐部长3—10厘米,宽2—5厘米,三角状卵形,短锐尖,稀倒卵形而渐尖,下弯。肉穗花序单性,雌花序倒卵圆形,花密,长2厘米;雄花序圆柱形,长2厘米,粗5毫米;附属器深紫色,圆柱形,长2—7.5厘米,下部粗5—6毫米,向上略收缩,上部棒状,粗5—7毫米,基部明显具细柄;此柄在雄花序上长8毫米,光滑,在雌花序上长10毫米,具少数钻形中性花。雄花近无柄,花药通常4,近球形,裂缝椭圆形。雌花:子房倒卵圆形,胚珠2—3,花柱短,柱头盘状。浆果红色,截球形,直径可达7毫米,长达8毫米,冠以黑色柱头,种子1,圆球形,褐色,有细疣状突起。花期5—6月,果期7—8月。

产云南西北部(德庆、凤庆、丽江)至西藏南部聂拉木、樟木,海拔2700—3600米,常生于铁杉林或高山栎林下。尼泊尔、不丹、印度东北部、缅甸北部也有。

块茎入药,据说,可用作麻醉剂(云南)。



1—4.猪笼南星 *Arisaema nepenthoides* (Wall.) Mart.: 1.植株, 2.佛焰花序, 3.雄性肉穗花序, 4.雄花。5—6.隐序南星 *A. wardii* Marg.: 5.植株(♂), 6.雄花。7—9.藏南绿南星 *A. jacquemontii* Blume: 7.佛焰花序, 8.雄性肉穗花序, 9.雄花。(肖 溶绘)