

长 8—10 厘米,圆柱形。叶片鸟足状分裂,裂片 5—13,长圆形或椭圆形,全缘或具细齿,中裂片长约 10 厘米,宽 2.5—3 厘米,侧裂片依次渐小。花序柄略短于叶柄,淡紫色至深紫色。佛焰苞圆柱形,管部长 5.5—7.5 厘米,紫色至深紫色,有白色条纹,边缘略外卷;檐部卵形,浓紫色,下弯,先端渐狭,长 7 厘米,宽 4—5 厘米。肉穗花序单性,雄花序圆锥形,长 1.5 厘米,基部粗 1 厘米,花药深紫色;附属器紫色,棒状,具纵条纹,长 4 厘米,上部粗 8—9 毫米,基部较狭,截形,具长 5—6 毫米的柄。

据记载,产陕西太白山、华山等地。分布于日本。

附注: 陕西秦岭标本未见到。《秦岭植物志》1: 286, 图 256. 1976 中关于本种的叙述和图都是云台南星 *A. du-bois-reymondiae*, 因此, 秦岭是否确有本种, 还有疑问。

62b. 绿苞细齿南星

var. *viridescens* Nakai in Icon. Pl. As. Orient. 2 (2): tab. 55. 1937.——*Arisaema serratum* f. b. *plumei* Makino in Tokyo Bot. Mag. 15: 129. 1901 p. min. p., excl. syn.; Krause in Fedde, Rep. Sp. Nov. 12: 314. 1922.

佛焰苞管部绿白色,檐部绿色。

据 Krause 记载, 产浙江天目山 (Limpricht 318, 815)。分布于日本。标本未见。

组 11. 细柄组——Sect. *Tenuipistillata* Engl. in Engl., Pflanzenr. 73 (4, 23F): 151 et 195. 1920.

块茎近球形,稀根茎状。叶 1—2, 叶片掌状,有时鸟足状分裂。佛焰苞檐部卵形或披针状卵形,内弯,附属器细圆柱形,基部增粗,具柄,直立或略弯,外露。花药纵裂或环裂。雌雄异株。

63. 短苞南星

Arisaema brevispathum Buchet in Lecte., Not. Syst. 2 (4): 126. 1911; Engl. in Engl., Pflanzenr. 73 (4, 23F): 196. 1920.

块茎小,球形,直径 1.5 厘米,高约 1 厘米。鳞叶下部管状,上部张开,先端钝,长 13 厘米。叶 1, 叶柄长 20—25 厘米,粗 1.5—2 毫米,中部以下具鞘; 叶片掌状分裂,小叶 6—8, 狭披针形,极不等,长 2—7 厘米,宽 4—10 毫米,锥状渐尖,具细锯齿。花序柄柔弱,短于叶柄,长 13—16 厘米,略下垂。佛焰苞长 5—5.6 厘米,绿色,有苍白色条纹,管部圆柱形,淡白色,长 3.5 厘米,粗 8 毫米,喉部近截形;檐部比管部短,狭三角形,长 2.5 厘米渐尖,具长 6—7 毫米的短尾。肉穗花序单性,雄花序短圆锥形,长 9—14 毫米,上部粗 1 毫米,花较密;附属器极纤细,直立,长 2.5 厘米,细圆柱形,基部增粗、截形,具长 1.5—3 毫米的柄,先端钝,稍外露。雄花无柄,雄蕊 2, 药室近球形,顶孔近圆形,药隔几不存在。

我国特有,产四川东部城口。模式标本未见。

64. 藏南绿南星 图版 34: 7—9