

开裂,雌花序基部粗 1.2 厘米,子房绿色,陀螺状,无花柱,柱头小。附属器完全不存在,极稀为短圆柱形,长 0.1—1.5 厘米。花期 5—6 月。

产西藏南部聂拉木县樟木,生于海拔 2400—2500 米的山坡林下或林间草地。也分布于尼泊尔。

本种的显著特点是无附属器,花药环裂;果期易与一把伞南星 *A. erubescens* 混淆,如注意到本种果序柄远短于叶柄,直立,叶裂片少、较宽大等,亦可区别。

组 13. 伞叶组——Sect. *Sinarisaema* Nakai in Journ. Jap. Bot. 25: 6. 1950; Hara, Fl. E. Himal. ed. 2: 347. 1971.——Sect. *Radiatisecta* Schott, Prodr.: 42. 1860. p. p.——Sect. *Peltatisecta* Schott, l. c. 48 p. p.——Sect. *Clavata* Engl. in Engl., Pflanzenr. 73 (4, 23F): 171. 1920 p. p.

块茎近球形。叶 1—2, 叶片放射状分裂。佛焰苞檐部披针形卵形,内弯或盔状。肉穗花序单性,附属器圆柱形、棒状或纤细,基部狭,无柄,常于下部具钻形中性花,花药裂孔圆形或卵形。

70. 洱海南星

Arisaema undulatum Krause in Fedde, Rep. Sp. Nov. 12: 313. 1922.

块茎不详。叶 1, 叶柄圆柱形,长约 20 厘米,粗 4—5 毫米;叶片薄纸质,放射状分裂,裂片 14, 无柄,长披针形或线状披针形,凸尖,具长 4—6 厘米的线形尾尖,基部渐狭,边缘波状,除尾尖外长 12—14 厘米,宽 1.5—2 厘米,侧脉多数,与中肋成锐角,斜伸,集合脉距边缘 2—3 毫米。花序柄短于叶柄,圆柱形,长 12 厘米,粗 6—7 毫米。佛焰苞青紫色带绿;管部圆柱形,长 4 厘米,粗 1.6 厘米;檐部直立,倒卵状长圆形或倒卵状披针形,长 10 厘米,宽 5—6 厘米,先端骤狭为长 5—6 厘米的尾尖。肉穗花序单性,雌花序圆柱形,花密,长 3 厘米,粗 1 厘米;附属器粗棒状,钝,向基部渐狭,上部粗约 1 厘米。子房倒卵圆形,长 1.5 毫米,柱头小,头状。

我国特有,产云南大理上关洱海边,海拔 2100 米。标本未见。

据原描述,与一把伞南星 *A. erubescens* 非常接近,只是叶裂片边缘波状,附属器较粗壮,粗达 1 厘米;是否能独成一种,还有待研究。

71. 溪南山南星

Arisaema oblancheolatum Kitamura in Acta Phytotax. Geobot. 10: 188. 1941.

鳞叶长 24—27 厘米,先端钝,紫色。叶 2, 叶柄长 24—25 厘米;叶片放射状分裂,倒披针形,近相等,长 15—20 厘米,中部以上宽 3.5—3.8 厘米,先端渐尖,线形,向基部渐狭,具柄,全缘,波状,侧脉纤细,弧曲上升,集合脉距边缘 2—3 毫米。花序柄长 8 厘米,粗 1.5 厘米。佛焰苞: 管部长 6 厘米,紫色具白色条纹,喉部边缘狭外卷;檐部卵状披针形,