

产西藏南部和东南部至云南西北部,海拔 2600—3200 米,生于山坡林下。也分布于锡金、不丹、尼泊尔。

与一把伞南星 *A. erubescens* 多少相似,但本种附属器明显具柄,先端密生刺毛或疣突。

79. 缘毛南星 图版 37: 9

Arisaema ciliatum H. Li, 植物分类学报 15 (2): 108, 图版 10: 3. 1977.

多年生草本,块茎圆球形,直径 2.5 厘米;鳞叶 3,膜质,下部圆筒状,上部长圆形,先端钝,最内面的长 14 厘米。叶 1,叶柄长 27 厘米,下部 15 厘米鞘状,鞘顶端斜截形。叶片放射状分裂,裂片 14,无柄,椭圆形,向两头长渐狭,长 4—7.5 厘米,宽 1.2—1.4 厘米,基部狭楔形,先端长渐尖,中肋背面隆起,侧脉极细弱,网脉不明显。花序柄比叶柄短,长 15 厘米,佛焰苞长约 10 厘米,紫色具淡绿色纵条纹,管部圆筒状,向上稍扩大,长 4.7 厘米,粗约 1.3 厘米,喉部边缘无耳,斜截形,具硬缘毛;檐部长圆披针形,近直立,长 4.5 厘米,宽约 2.1 厘米,先端骤狭长渐尖,青紫色,具绿白色纵条纹,后者于边缘附近连结。肉穗花序单性,雄花序长圆锥形,长 2.3 厘米,基部粗约 3 毫米,花较疏,雄花具短柄,花药 2—3,黄色,药室顶孔开裂。附属器细棒状,直立,青紫色,长 5.5 厘米,粗 2 毫米,基部略狭,具三两钻形中性花,先端钝。花期 6 月。

我国特有,产云南丽江东面 27°30', 海拔 3000 米的松林中。

本属下列 3 种,因原描述欠详,未见到模式标本,暂存疑。

80. 鄂西南星

Arisaema silvestrii Pamp. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. 22: 262. 1915.

块茎球形,小。鳞叶先端扩展,微缺,具小尖头,长 10—17 厘米。叶 2,叶柄长 20—29 厘米,下部 10—17 厘米具鞘;叶片鸟足状分裂,裂片 9,倒披针形,骤狭渐尖,全缘,基部渐狭,长 9—10 厘米,宽 3—4 厘米,中裂片具长 3—10 毫米的柄;侧裂片无柄,较小。花序柄短于叶柄,与叶鞘等长或稍长。佛焰苞紫色,檐部内面具白色条纹,管部长 5—7.5 厘米;檐部长 5—7.5 厘米,宽 3—4 厘米,长圆状椭圆形,短渐尖。肉穗花序长 2.5 厘米;附属器长 8 厘米,直立,棒状,基部具柄,散生长 5 毫米的、反折的线形中性花,先端浑圆,粗 4—5 毫米,下部纺锤形。

产湖北西部。模式标本: Pampanini 4108, 4109。

81. 南漳南星

Arisaema nantciangense Pamp. in Nuov. Giorn. Ital. 22: 261. 1915.

块茎球形。鳞叶长 7—10 厘米,宽 1.5—3 厘米,先端钝圆,具短尖头。叶 2,叶柄细,长 20 厘米,下部具宽鞘,鞘长 15 厘米,宽 14 毫米;叶片鸟足状分裂,裂片 7,披针形,渐尖,全缘,长 14—20 厘米,宽 5.5—6 厘米,侧裂片小,中裂片具短柄,余无柄。花序柄长 15 厘米,约与叶鞘等长。雌花序长 2 厘米(果期),具短梗;附属器长 3.5 厘米。