

产湖北南漳。模式标本: Pampanini 4107.

82. 樟榔乡南星 独脚莲

Arisaema zanlanscianense Pamp. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. 22: 262. 1915.

块茎和叶不详。佛焰苞管部圆柱形,喉部斜截形,长6厘米;檐部扁平,扩展,椭圆状圆形,短渐尖,基部渐狭,两面有纵脉4条,长13—16厘米,中部宽8—10厘米。雌花序长4厘米,上部散生长5毫米的钻形中性花;附属器具条纹,长,具柄,直立,长14厘米,粗3.5毫米。花期4月。

产湖北樟榔乡 (Zanlan-scian)。模式标本: Pampanini 4053。

33. 斑龙芋属——*Sauromatum* Schott

Schott, Melet. 1: 17. 1832.

多年生草本。块茎近球形,常大,大都于一年出1叶,另一年出鳞叶及花序、稀出营养叶和花序,1个块茎往往是出了多年的叶之后才出花。叶柄圆柱形,多少具斑块,叶片鸟足状全裂或深裂。花序柄短。佛焰苞凋存,管部长圆形,基部偏肿,前面多少闭合无缝;檐部长披针形,内面深紫色,常具斑块,后期反折并螺旋状旋卷。肉穗花序比佛焰苞短,下部为圆锥形雌花序,上部是近圆柱形的雄花序,雌雄花序之间存在一段长达4倍的间隔(中性花序),中性花序下部1/2之上具稀疏的中性花;顶生附属器圆柱形,伸长,远长于整个具花的肉穗花序。花单性,无花被。雄花具少数雄蕊;花药无柄,扁,药隔细,于花药释放后略外凸,药室对生,长圆倒卵形,室孔卵形,顶裂。雌花:子房1室,花柱初时极短,后来内凹,柱头盘状,胚珠2—4,直立,葫芦状,着生于室底具乳突的垫状胎座上;中性花柄棒状,稀等粗而成圆柱状,伸展,稀疏。浆果倒圆锥状,具皱褶,先端深紫色,其余紫色,增厚为球状,顶部因柱头下陷而成窝孔状;种子球形,先端具细尖,常一侧平坦,光滑,种阜倒圆锥形,种皮薄,珠孔稍明显。胚乳丰富,胚具轴。

6种。分布于非洲、东南亚至大洋洲。我国西藏、云南有2种。

分 种 检 索 表

- 1. 叶中裂片长圆形,长10厘米,宽4.5厘米……………1. 斑龙芋 *S. venosum* (Ait.) Kunth
- 1. 叶中裂片线状披针形,长11厘米,宽1.2厘米……………1. 短柄斑龙芋 *S. brevipes* (Hook.f.) N. E. Brown

1. 斑龙芋 图版 38: 1—10

Sauromatum venosum (Aiton) Kunth, Enum. Pl. 3: 281. 1841; Har, Fl. E. Himal. ed. 2: 155. 1971. — *Arum venosum* Aiton, Hort. Kew. 3: 315. 1789. — *Arum guttatum* Wall., Pl. As. Rar. 2: 10, t. 115. 1831. — *Sauromatum*