

紫色的倒卵状隔片，隔片长、宽 3—4 毫米，盖抱着雄花序；檐部旋卷状，长 4.5—5.5 厘米，下部边缘靠合并扭转，上半部张开并旋卷，人为展平时椭圆形，长渐尖，宽 1.4 厘米，外面暗青紫色，暗淡，内面淡紫色，密布暗青紫色斑点和曲纹，光亮。肉穗花序；雌花序淡黄色，圆锥状，光滑，高 3 毫米，下部粗 5 毫米，上部粗 3 毫米；雌雄花序之间的间隔长 7—8 毫米，白色，细圆柱形，光滑；雄花序略呈圆锥状、椭圆状或球状，黄色，长 2.5 毫米，粗 1.5 毫米，雄花序轴肥大，肉质，向上延伸为长 1—2 毫米的球形附属器，附属器白色，光滑，与佛焰苞管顶部相接。雌花 10，分 2 轮，内轮 5，不育，柱头淡黄色，无柄，扁球状，具浅槽；外轮 5，能育，略具柄，柱头大，盾状，外向，具浅槽，1 室，胚珠多数，珠柄短，排列于室内近轴一侧的线形侧膜胎座上。雄花无柄，花药 2—4 室，药室球形，花粉黄色。聚合果卵球形，长粗约 1 厘米，黄棕色；种子多数，下部的角状，上部的倒锥状，长 3—4 毫米，粗 1—1.5 毫米，淡褐色，密生暗紫色斑点。花期 11—12 月。

我国特有，产云南西双版纳，生于无霜地区的河滩沙地，雨季埋没于河沙中，冬季出露。模式标本采自云南勐腊县勐崙罗梭江河滩。

全草入药，治跌打损伤、风湿关节炎、痧症、急性肠胃炎(云南思茅)。

本种佛焰苞管部仅 1 节；雌花 10，2 轮，内轮不育；叶片较宽而厚，皆与旋苞隐棒花 *C. retrospiralis* 不同。

4. 广西隐棒花

***Cryptocoryne kwangsiensis* H. Li**, 植物分类学报 15 (2): 109, 图版 6:5. 1977.

多年生草本。根茎不详。叶少，丛生，叶柄明显，长 10—12 厘米，干时稻黄色，膜质，鞘状，宽 7—8 毫米，向上渐狭，叶片薄膜质，线形，干时黑褐色，长 16—19 厘米，宽 1.1—1.7 厘米，先端锐尖，基部楔形，全缘；中肋明显，宽 1.5—2 毫米，侧脉细弱上举，网脉极稀少，微弱。佛焰苞长约 20 厘米，短于叶，不具花序的管部(上部)长 16—18 厘米，粗 2.5 毫米；檐部长 3—4 厘米，螺状左旋，展开宽约 4 毫米，线形，长渐尖，边缘浅波状。

我国特有，产广西西北部。模式标本：秦仁昌 8504、8505。

本种叶片宽长，叶柄明显；佛焰苞管上部长达 18 厘米，与其它国产种显然不同。与泰国的 *C. costata* Gagn. 相类似，但后者叶片短(长 8—10 厘米，宽 8—20 毫米)；佛焰苞管上部长仅 4 厘米，也可以区别。

35. 半夏属——*Pinellia* Tenore

Tenore in Atti R. Acad. Sc. Nap. 4: 57 cum t. 10. 1830, ic.

ex ejusdem Cat. Ort. Neap. 91. 1830.

多年生草本，具块茎。叶和花序同时抽出。叶柄下部或上部，叶片基部常有珠芽；叶片全缘，3 深裂、3 全裂或鸟足状分裂，裂片长圆椭圆形或卵状长圆形，侧脉纤细，近边缘有集合脉 3 条。花序柄单生，与叶柄等长或超过。佛焰苞宿存，管部席卷，有增厚的横