

体相连。花未见，据记载，肉穗花序有2个雄花和1个雌花。

产南北各地，生于水田、水塘、湖湾、水沟，常与浮萍 *Lemna minor* 形成覆盖水面的飘浮植物群落。全球各温带及热带地区广布。

全草入药，发汗、利尿。治感冒发热无汗、斑疹不透、水肿、小便不利、皮肤湿热。也可作猪饲料，鸭也喜食，为放养草鱼的良好饵料。

2. 少根紫萍

Spirodela oligorrhiza (Kurz) Hegelm., Lemnac. 147, t. 16. 1868; Matsum. et Hayata in Journ. Coll. Sci. Univ. Tokyo 22: 462. 1906; Ohwi, Fl. Jap.: 261. 1956; Backer, Fl. Jav. 3: 127. 1968.—*Lemna oligorrhiza* Kurz in Journ. Linn. Soc. Bot. 9: 267, t. 5. 1867; Hook. f., Fl. Brit. Ind. 6: 557. 1893.—*Lemna melanorrhiza* Muell. et Kurz in Journ. Bot. 115. 1867.

叶状体膜质，狭倒卵形或长圆形，3—5脉，长4—6毫米，宽1.5—2.5毫米，表面绿色，背面紫色，根3—5条，甚长。

产我国台湾。分布于日本、大洋洲至波利尼西亚。标本未见。

2. 浮萍属—*Lemna* L.

L., Sp. Pl. ed. 1: 970. 1753.

飘浮或悬浮水生草本。叶状体扁平，2面绿色，具1—5脉；根1条，无维管束。叶状体基部两侧具囊，囊内生营养芽和花芽。营养芽萌发后，新的叶状体通常脱离母体，也有数代不脱离的。花单性，雌雄同株，佛焰苞膜质，每花序有雄花2，雌花1，雄蕊花丝细，花药2室，子房1室，胚珠1—6，直立或弯生。果实卵形，种子1，具肋突。

约15种。广布于南北半球温带地区。我国南北有2种。

分种检索表

1. 浮悬植物；叶状体具细长的柄，常数代连在一起，椭圆形或倒披针形，长8—10毫米，宽2—3毫米……
- 1. 品藻 *L. trisulca* L.
1. 飘浮植物；叶状体无柄。
 2. 叶状体对称，倒卵形、倒卵状椭圆形；胚珠弯生…………… 2. 浮萍 *L. minor* L.
 2. 叶状体不对称，斜倒卵形或斜倒卵状长圆形；胚珠直立…………… 3. 稀脉浮萍 *L. perpusilla* Torr.

1. 品藻(事物绀珠) 图版42: 2

Lemna trisulca L., Sp. Pl.: 970. 1753; Hook. f., Fl. Brit. Ind. 6: 557. 1893; О. И. Кузенева в В. К. Шишкин. ФЛ СССР 3: 491. 1935; Hand.-Mazt., Symb. Sin. 7: 1368. 1936; Gagn. in Lecte., Fl. Gén. Indo-Chine 6: 1198. 1942; 裴鉴、单人骅，华东水生维管束植物：33，图40A，1952; Ohwi, Fl. Jap. 261. 1956; 刘慎谔等，东北植物检索表：558，图版210：图4，1959；秦岭植物志1(1): 289, 图259.