

分种检索表

1. 花药长圆状；萼片及果无毛或被微毛；叶背面常无毛。
 2. 叶大，长 15—25 厘米，宽 3—4.7 厘米，叶边缘有一列长硬毛 2. 攀援孔药花 *P. scandens* Hong
 2. 叶小，长 6—12 毫米，宽 1.5—3 毫米，叶上面近边缘处有一列白色长硬毛 3. 小叶孔药花 *P. microphylla* Y. Wan
1. 花药滴水状；萼片及果被长硬毛；叶背面常被毛 1. 孔药花 *P. ramosa* Hong
 1. 孔药花（植物分类学报） 图版 20：1—5

Porandra ramosa Hong in Act. Phytotax. Sin. 12 (4): 462. Pl. 89. figs. 1—5.
1974；中国高等植物图鉴 5：394. 图 7617. 1975.


多年生攀援草本。茎高达 4 米，无毛，上部分枝，节间长 5—20 厘米。叶鞘长 2.5—6 厘米，初时被硬毛，后变无毛且为棕色，口部有长睫毛；叶有短柄，叶柄长 5—7 毫米，叶片椭圆形至披针形，长 8—16 厘米，宽 2—4.5 厘米，基部圆钝至宽楔形，顶端渐尖或尾状渐尖，背面多少被硬毛。头状花序有花数朵；苞片三角状卵圆形，长 3 毫米，无毛或有疏硬毛；萼片矩圆形，龙骨状，长 5—7 毫米，宽 3 毫米，外被长硬毛；花瓣粉红色，长圆形，长 7 毫米，宽近 3 毫米；花丝长 7 毫米，花药滴水状，药室顶端分离，顶孔开裂，长 2 毫米，宽 1.5 毫米；子房被多细胞长硬毛，花柱长 4 毫米。蒴果卵状球形，三棱，长 7—9 毫米，直径 5—6 毫米，被长硬毛，每室有 2 颗种子。种子长 3—4 毫米。花期 4—8 月。

产云南南部（凤庆、景东、临沧、澜沧、西双版纳、金平、屏边、河口、西畴、文山、麻栗坡、富宁）、贵州（安龙、兴义）和广西西部（隆林、靖西、龙州）。生于海拔 400—2 400 米的林中。模式标本采自云南凤庆。

2. 攀援孔药花（植物分类学报） 图版 20：6—8

Porandra scandens Hong in Act. Phytotax. Sin. 12 (4): 462. Pl. 89. figs. 6—8.
1974. — *Forrestia marginata* auct. non Hassk. ; Cherfils in Fl. L'Indo-Chin. 6: 856. fig. 85. 1—3. 1937.

多年生攀援草本，茎细长，高达 4—7 米，林中攀援，基部直径达 1.5 厘米，上部分枝，节间长 5—15 厘米。叶鞘长约 3 厘米，口部被长睫毛，叶柄极短，叶片长卵形至披针形，长 15—25 厘米，宽 2—6 厘米，基部楔形至圆钝，顶端渐尖至尾状渐尖，边缘有一列长硬毛。头状花序小，有花数朵；苞片三角状卵圆形，长约 2 毫米；萼片矩圆形，龙骨状，无毛，长 5—7 毫米，宽 3 毫米；花瓣绿色，分离，3 枚，椭圆形，长 6 毫米，宽 2.5 毫米，花丝长，伸出花外，花药矩圆形，长 2.5 毫米，宽不及 1 毫米，顶端孔裂；子



图版 20 1—5. 孔药花 *Porandra ramosa* Hong: 1. 植株一部分; 2. 花; 3. 花药; 4. 子房及花柱;
5. 果实。6—8. 攀援孔药花 *P. scandens* Hong: 6. 花; 7. 花药; 8. 果实。(蔡淑琴绘)。