

蒴果的室中垒置，多皱，种脐在腹面，条状，胚盖位于背侧。

单种属，分布于亚洲东南部。

1. 竹叶字 (中国种子植物科属辞典) 图版 21: 1—3

Streptolirion volubile Edgew. in Proc. Linn. Soc. 1: 254. 1845 et in Trans. Linn. Soc. 20: 90. tab. 2. 1846; Hong in Act. Phytotax. Sin. 12 (4): 463. 1974; 中国高等植物图鉴 5: 394. 图 7618. 1975. — *Streptolirion cordifolium* (Griff.) Kuntze, Rev. Gen. Pl. 2: 722. 1891. — *S. duclouxii* Lévl. et Vant. in Fedde Repert. Sp. Nov. 6: 114. 1908—1909 — *S. mairei* Lévl. in Fedde Repert. Sp. Nov. 11: 302. 1912.

模式标本采自喜马拉雅山南坡。本种包含两个在被毛上不同的类型，而这两个类型的区分是与地理及海拔相联系的，本书作两个亚种处理。

1a. 竹叶字 (模式亚种)

subsp. **volubile**

多年生攀援草本，极少茎近于直立。茎长 0.5—6 米，常无毛。叶柄长 3—10 厘米，叶片心状圆形，有时心状卵形，长 5—15 厘米，宽 3—15 厘米，顶端常尾尖，基部深心形，上面多少被柔毛。蝎尾状聚伞花序有花 1 至数朵，集成圆锥状，圆锥花序下面的总苞片叶状，长 2—6 厘米，上部的小而卵状披针形。花无梗；萼片长 3—5 毫米，顶端急尖；花瓣白色、淡紫色而后变白色，线形，略比萼长。蒴果长约 4—7 毫米，顶端有长达 3 毫米的芒状突尖。种子褐灰色，长约 2.5 毫米。花期 7—8 月，果期 9—10 月。

产西藏东南部 (墨脱、门工、察隅)、云南 (全境)、贵州 (全境)、四川 (稻城、乡城、雅江、乾宁、丹巴、康定、小金、金川、马尔康、宝兴、茂汶、都江堰、平武、南川、城口、奉节、巫溪、峨眉、甘洛、米易和大理)、甘肃 (两当、文县、徽县)、陕西 (沔县、洋县、宁陕、山阳、佛坪、太白山、终南山)、山西 (无具体地点)、河北 (邢台、内丘、赞皇、涞源、易县、小五台、怀来、兴隆)、北京 (昌平、延庆和房山)、辽宁 (千山)、浙江 (淳安、天目山)、河南西部 (卢氏、栾川、伊阳、嵩县、西峡)、湖北 (鹤丰、利川、建始、兴山、房县)、湖南西部 (无具体地点) 和广西 (隆林、凤山、凌乐、东兰、南丹、凌云、全州)。通常生于海拔 2 000 米以下的山地，在云南德钦、维西、西藏门工可生长于海拔 3 200 米的地方。不丹、印度东北部至越南、老挝、柬埔寨、朝鲜、日本也有分布。

1b. 红毛竹叶字 (亚种) (植物分类学报)

subsp. **khasianum** (C. B. Clarke) Hong in Act. Phytotax. Sin. 12 (4): 463. 1974. — *Streptolirion volubile* var. *khasianum* C. B. Clarke in DC. Monogr. Phanerog. 3: 262. 1881.

与模式亚种不同在于本亚种植株全体密生棕色多细胞长毛，全为缠绕习性。

产贵州西南部 (普安)、云南南部 (屏边、金平、麻栗坡、绿春、澜沧、临沧、镇康、



图版 21 1—3. 竹叶苣 *Streptolirion volubile* Edgew. subsp. *volubile*: 1. 植株一部分; 2. 花; 3. 果实。

4—6. 竹叶吉祥草 *Spatholirion longifolium* (Gagnep.) Dunn: 4. 植株一部分; 5. 花; 6. 果实。

(许梅娟绘)