

凤庆、景东、保山)和西藏(墨脱)。生于海拔1 000—3 000米的热带,亚热带山地林下。印度东部和越南北部山地也有分布。模式标本采自印度东部。

本亚种不仅在形态上与模式亚种不同,而且本亚种生长于热带,亚热带的较高海拔的山地林中,而模式亚种在这一地区却只占据较低海拔的地带,可见两亚种是彼此替代的。

4. 竹叶吉祥草属 *Spatholirion* Ridl.

Ridl. in Journ. Bot. **34**: 329. tab. 360. 1896; Forman L. L. in Kew

Bull. **16**: 215. 1962; Hong in Act. Phytotax. Sin. **12** (4): 463. 1974.

缠绕草本,茎细长。侧枝穿鞘而出。圆锥花序具长柄。与叶对生,并自叶鞘口内伸出,而不是穿透叶鞘而出,圆锥花序由多个聚伞花序组成,在最下一个聚伞花序基部有一个叶状总苞片,其余聚伞花序基部无总苞片。花在圆锥花序中最下一个聚伞花序上的为两性,在其余聚伞花序上的均为雄性;萼片3枚,分离,舟状,草质;花瓣宽条形;雄蕊6枚,相等而且全育,花丝被绵毛;子房3室,每室有8颗胚珠。果实卵状三棱形,3片裂。种子在每个果实中成两列垒置,多角形,具网纹,种脐条状,胚盖位于背面。

和竹叶子属不同在于本属仅圆锥花序最基部一个聚伞花序有总苞片,其余均无总苞片;侧枝并非每节生花序;子房每室有胚珠8颗。过去这两个属分合不定,认为只是胚珠数目和排列上的区别(其实排列是一致的)。Forman (1962)对这两个属的关系作了比较认真的探讨,认为是两个分明不同的属。但他着重强调所谓花序枝(inflorescence-shoots)的区别,说竹叶子属的花序生于花序枝(即缩短的侧枝)上,这种花序枝穿透叶鞘而出,而它本身在近基部又有一个叶鞘。竹叶吉祥草属无这种花序枝,花序总是与叶对生,从叶鞘口部伸出。其实,它们都有这种所谓的花序枝,且都穿鞘而出,其近基部也都有叶鞘。竹叶子属的花序也是与叶对生,从叶鞘口部伸出。它们不同的是,竹叶子属的侧枝除第一节外,几乎每节生有花序,而竹叶吉祥草属的侧枝不是每节生花序,而且侧枝很长,标本上常只有侧枝的一部分,因此被误为就是主茎。

2种,我国产1种,另1种产泰国。

模式种: *Spatholirion ornatum* Ridl.

1. 竹叶吉祥草(植物名实图考) 秦归(四川),马耳草(云南蒙自),白龙须(云南潞西),猪叶菜 图版21: 4—6

Spatholirion longifolium (Gagnep.) Dunn in Kew Bull. 162. 1911; Hong in Act. Phytotax. Sin. **12** (4): 464. 1974; 中国高等植物图鉴 **5**: 395, 图7619. 1975. — *Streptolirion longifolium* Gagnep. in Bull. Bot. Soc. France **47**: 334. 1900. — *Spatholirion scandens* Dunn l. c. — *Pollia dielsii* Lévl. in Fedde Repert. Nov. Sp. **8**: 285. 1910.