

长，花序梗纤细如丝，也是颇独特的。

14. 根茎水竹叶 (植物分类学报) 图版 26: 7—8

Murdannia hookeri (C. B. Clarke) Brückn. in Engl. et Prantl, Nat. Pflanzenfam. ed. 2, **15a**: 173. 1930; Hong in Act. Phytotax. Sin. **12** (4): 472. 1974. —— *Aneilema hookeri* C. B. Clarke, Commel. et Cyrt Beng. 29. tab. 17. 1874; idem in DC. Monogr. Phanerog. **3**: 204. 1881. —— *A. bodinieri* Lévl. et Vant. in Mem. Soc. Nat. Math. Cherb. **35**: 389. 1906. —— *Floscopa cavaleriei* Lévl. et Vant. in Mem. Soc. Nat. Math. Cherb. **35**: 383. 1906 —— *Pollia cavaleriei* (Lévl. et Vant.) Lévl., Fl. Kouy-Tcheou 77. 1914.

多年生草本。根状茎横走，直径约 3 毫米，无毛。茎上升，下部节上生根，长 60 厘米，有时分枝，直径 3—5 毫米，密生一列毛。叶披针形，基部稍抱茎，顶端短渐尖，头钝，长 12 厘米，宽 1—2.2 厘米，无毛，仅叶鞘密生一列长硬毛。圆锥花序顶生，由数个蝎尾状聚伞花序组成；最下 1—2 个总苞片叶状，几乎与叶等大，其余的很小，长不过 1 厘米；花序各部分无毛；蝎尾状聚伞花序长 2—4 厘米；苞片小，长仅约 2 毫米；花梗在果期长约 6 毫米，伸直；萼片长 4 毫米，舟状、无毛；花瓣淡紫色或近于白色，倒卵圆形，长约 6 毫米，远大于萼片；能育雄蕊 3 枚。蒴果长椭圆状三棱形，两端急尖，顶端有宿存花柱留下的突尖，长 6—7 毫米，每室有种子 3 颗。种子灰色，有红色斑点。花果期 6—9 月。

产云南（嵩明、大关）、四川（南川、越西、汉源、洪雅）、贵州（兴仁、印江）、广西（龙胜）、湖南（宜章、新宁）、广东（阳山）、福建（崇安）。生于海拔 2 800 米以下的林下或山谷沟边。印度东部也有分布。模式标本采自印度东部（Khasia）。

组 5. 双籽组 Sect. Terminatae Brückn. in Engl. et Prantl, Nat. Pflanzenfam. ed. 2, **15a**: 173. 1930, p. p. quoad species subsect. *Duvulatae*; Hong in Act. Phytotax. Sin. **12** (4): 472. 1974.

组模式种: *M. simplex* (Vahl) Brenan

与前一组不同在于本组植物每室仅具 2 枚种子。其次，叶多为禾叶状；聚伞花序常紧缩，花期呈头状，果期头状或否。

15. 裸花水竹叶 (广州植物志) 图版 27: 1—2

Murdannia nudiflora (Linn.) Brenan in Kew Bull. 189. 1952; Hong in Act. Phytotax. Sin. **12** (4): 473. 1974; 中国高等植物图鉴 **5**: 400. 图 7629. 1975. —— *M. malabarica* (Linn.) Brückn. in Engl. et Prantl. Nat. Pflanzenfam. ed. 2, **15a**: 173. 1930; Hand.-Mazz., Symb. Sin. **7**: 1244. 1936. —— *Commelina nudiflora* Linn. Sp. Pl. **1**: 41. 1753, p. p. et Mant. Pl. **1**: 177. 1767. —— *Aneilema nudiflorum* (Linn.) R. Br.,



图版 26 1—3. 大果水竹叶 *Murdannia macrocarpa* Hong: 1. 植株; 2. 花; 3. 果实。4—6. 紫背鹿衔草 *M. divergens* (C. B. Clarke) Brückn.: 4. 植株; 5. 花; 6. 果实。7—8. 根茎水竹叶 *M. hookeri* (C. B. Clarke) Brückn.: 7. 植株上部; 8. 茎一部分, 示节上生根。(许梅娟绘)