

9. 网籽草属 *Dictyospermum* Wight

Wight, Ic. Pl. Ind. Or. 6: 29. tab. 2069. 1853; Hong in Act. Phytotax. Sin. 12 (4): 476. 1974. — *Aneilema* Sect. *Dictyospermum* C. B. Clarke, Commel. et Cyrt. Beng. 35—37. tab. 23—25. 1874 et in DC. Monogr. Phanerog. 3: 216. 1881. — *Piletocarpus* Hassk. in Flora, 49: 212. 1866. — *Rhopalephora* Hassk. in Bot. Zeit. 58. 1866.

多年生草本。聚伞花序多花而长，组成顶生圆锥花序。萼片和花瓣各 3 枚，均分离。大小近相等。能育雄蕊位于花后方（近轴面），3 枚，中间一枚对瓣；退化雄蕊 3 枚或缺，顶端 2 裂，横叉开。子房 3 室，每室仅有 1 颗胚珠。蒴果圆球状，稍三棱形，果皮常硬壳质而光泽，有时被毛。种子具网纹或否，胚盖位于背侧。

本属很近于 *Murdannia* Royle 和 *Tricarpelema* J. K. Morton，但以能育雄蕊位于花的后方，退化雄蕊位于前方，顶端 2 裂，叉开，蒴果每室仅含一颗种子，不同于它们。

全属约 10 种，分布于亚洲热带。我国产 2 种。

模式种：*Dictyospermum montanum* Wight (= *Aneilema montanum* Wight)

分种检索表

1. 蒴果无毛，果皮革质；花序比叶短，几乎无总梗；叶片椭圆形 1. 网籽草 *D. conspicuum* (Bl.) Hassk.
 1. 蒴果密被柔毛；花序远远超出叶子，具长总梗；叶片卵状披针形 2. 毛果网籽草 *D. scaberrimum* (Bl.) J. K. Morton ex Hong

1. 网籽草 (植物分类学报) 白花鸭跖草 (海南) 图版 29: 3—5

Dictyospermum conspicuum (Bl.) Hassk., Commel. Ind. 22. 1870; Hong in Act. Phytotax. Sin. 12: 476. 1974, p. p. excl. specim. Guangxi. — *Commelina conspicua* Bl. Enum. Pl. Jav. 4: 1827. — *Aneilema conspicuum* (Bl.) Kunth, Enum. Pl. 4: 69. 1843; C. B. Clarke in DC. Monogr. Phanerog. 3: 218. 1881. — *Pollia pumila* auct. non Hall. f.; Merr. in Lingnan Sci. Journ. 13: 55. 1934.

多年生草本。根状茎横走，节上有棕黄色叶鞘，分枝由叶鞘基部穿孔而出。根极细长，茎上升或直立，高 10—35 (70) 厘米，下部节间长，有时达到 14 厘米，无毛。叶在茎中下部疏离，在茎顶密集，叶鞘棕色或棕黄色，无毛或仅口沿疏生睫毛，长至 2.5 厘米；叶片在茎下部的很小，在茎顶端的大，椭圆形，顶端短渐尖至尾状渐尖，基部渐狭