

产台湾、广东（温塘山）、海南（保亭、琼中）、广西（靖西、贺县）、贵州（册亨）、云南（绿春、西双版纳、临沧、景东、漾濞、福贡）、西藏南部（墨脱）。生于海拔 800—2 100 米的山谷林中。印度、斯里兰卡至印度尼西亚也有分布。模式标本采自印度尼西亚爪哇。

Faden (1977) 根据果实被钩状毛，花瓣颜色和具短爪把这个种和另外两或三个种置于 *Rhopalephora* Hassk. 中。

## 10. 假紫万年青属 *Belosynapsis* Hassk.

Hassk. in Flora 259. 1871; Brenan, in Journ. Linn. Soc. Bot. 59 (380):362. 1966; Hong in Act. Phytotax. Sin. 12(4):477. 1974. — *Dalzellia* Hassk. in Flora 594. 1865 (non *Dalzellia* Wight, Podostemaceae). — *Cyanotis* Sect. *Dalzellia* C. B. Clarke in DC. Monogr. Phanerog. 3: 241, 242. 1881.

多年生匍匐草本，具很长的根状茎。蝎尾状聚伞花序有花数朵（稀单朵），顶生或腋生，具短的总梗，总苞片叶状，而不为佛焰苞状。萼片 3 枚，分离，仅基部稍连合。花瓣 3 枚，分离。雄蕊 6 枚，全育，分离而等长，花丝被绵毛。子房 3 室，每室有胚珠 2 枚。蒴果椭圆状，具 3 沟。种子每室 1—2 颗，垒置，具网纹，种脐点状，胚盖位于顶端。

与 *Cyanotis* 不同在于本属总苞片非佛焰苞状，也非覆瓦状排列，具有附生或石生的习性，特别是本属花瓣完全分离，而不连合。

模式种：*Belosynapsis ciliata* Rolla Rao [= *Cyanotis ciliata* (Bl.) Bath. f.]

全属共 3 种，分布于亚洲南部。我国南部产 1 种。

### 1. 假紫万年青（中国种子植物科属辞典） 图版 30: 3—5

***Belosynapsis ciliata*** (Bl.) Rolla Rao in Not. Bot. Gard. Edinb. 25: 187. 1964; Hong in Act. Phytotax. Sin. 12(4):477. 1974; 中国高等植物图鉴 5:401. 图 7632. 1975; 海南植物志 4: 75. 图 994. 1977. — *Tradescantia ciliata* Bl., Cat. Buitenzorg, 61. 1823. — *T. capitata* Bl., Enum. Pl. Jav. 6. 1827. — *Cyanotis ciliata* (Bl.) Bakh. f. in Blumea, 6:399. 1950. — *C. capitata* (Bl.) C. B. Clarke in DC. Monogr. Phanerog. 3: 243. 1881. — *C. kawakamii* Hayata in Journ. Coll. Sci. Univ. Tokyo 22: 449. 1906. — *Belosynapsis capitata* (Bl.) Spreng et C. E. C. Fisch. in Kew Bull. 254. 1928.

多年生匍匐草本，多分枝，根状茎和茎总长可超过 50 厘米。茎无毛或有一列柔毛。叶鞘短，长仅约 3 毫米，膜质，被长睫毛；叶片披针形至长卵形，长 1.5—5 厘米，宽 1—1.5 厘米，边缘有睫毛，它处无毛或背面疏生细长硬毛。蝎尾状聚伞花序有花 2 至数朵，