

6. 地地藕 (滇南本草) 小竹叶菜 (四川) 图版 31: 5

Commelina maculata Edgew. in Trans. Linn. Soc. **20**: 89. 1846; Rolla Rao in Blumea **19**: 353. 1966; Hong in Act. Phytotax. Sin. **12** (4): 482. 1974. — *C. obliqua* Buch.-Ham. ex D. Don var. *viscida* C. B. Clarke in DC. Monogr. Phanerog. **3**: 178. 1881. — *C. paludosa* Bl. var. *viscida* (C. B. Clarke) Rolla Rao et Kammathy in Bull. Bot. Surv. Ind. **3**: 168. 1961; Rolla Rao in Not. Bot. Gard. Edinb. **25**: 181. 1964, excl. syn. *C. obliqua* var. *mathewii* et *C. paludosa* var. *mathewii*.

多年生草本，有一至数支天门冬状根，这种根直径可达 5 毫米。植株细弱，倾卧或匍匐，下部节上生根，多分枝。茎细长，无毛、疏生短毛或有一列硬毛，节间长可达 15 厘米。叶鞘长约 1 厘米，口沿生白色、黄色或棕、黄色多细胞睫毛，他处无毛或有一列硬毛；叶片卵状披针形或披针形，顶端短渐尖或长渐尖，长 4—10 厘米，宽 1.5—2.5 厘米，两面疏生细长伏毛。总苞片下缘合生而成漏斗状，通常 2—3 个（少 4 个）在茎顶端集成头状，无柄，或具长不到 5 毫米的短柄，长 1.5—2 厘米，顶端短急尖，无毛，或疏生多细胞倒伏刚毛。聚伞花序有花数朵，常 3—4 朵，仅盛开的花伸出佛焰苞之外，果期藏在佛焰苞内。花梗短，长约 3 毫米；萼片卵圆形，膜质，黄白色，长约 4 毫米；花瓣蓝色，前方 2 枚长达 1 厘米，圆形，下部有长 3 毫米的爪，后方 1 枚无爪，长 4 毫米。蒴果圆球状三棱形，3 室或由于其中一室不育而为 2 室，每室 1 种子，长 4 毫米，带有宿存的萼片。种子灰黑色，椭圆状，稍扁，近于光滑，长 3 毫米，胚盖位于背侧面。花果期 6—8 月。

产西藏（吉隆、聂拉木、错那、林芝、波密、墨脱）、四川（木里、米易、越西、石棉、会东）、贵州（纳雍、安龙、兴义、盘县）和云南（屏边、昆明、宾川、丽江、碧江、腾冲、泸水、鹤庆、兰坪）。生于海拔 2 900 米以下的林缘、草地、路边、水沟边等湿润处。印度、缅甸也有分布。模式标本采自印度北部。

最近于大苞鸭跖草，两者较难分，不同在于本种茎细弱，下部匍匐，节上生根，多分枝；叶小，长 4—10 厘米，宽 1.5—2.5 厘米；佛焰苞较小些，也较少些，常仅 2—3 个集成头状。

7. 波缘鸭跖草 (广州植物志)

Commelina undulata R. Br., Prodr. 270. 1810; C. B. Clarke in Monogr. Phanerog. **3**: 179. 1881, excl. var. *setosa*; 广州植物志 656. 1956; Hong in Act. Phytotax. Sin. **12** (4): 482. 1974. — *C. striata* Edgew. in Trans. Linn. Soc. **20**: 80. 1846. — *C. kurzii* C. B. Clarke in Journ. Linn. Soc. Bot. **11**: 144. 1871; Hand.-Mazz., Symb. Sin. **7**: 1244. 1936. — *C. obliqua* Buch.-Ham. var. *mathewii* C. B. Clarke, l. c. 178. 1881. — *C. poludosa* Bl. var. *mathewii* (C. B. Clarke) Rolla Rao et Kammathy in Bull. Bot. Surv. Ind. **3**: 168. 1961.



图版 31 1—2. 大苞鸭跖草 *Commelina paludosa* Bl. : 1. 植株; 2. 花. 3—4. 饭包草 *C. bengalensis* Linn. : 3. 植株; 4. 花. 5. 地地藕 *C. maculata* Edgew. : 植株一部分。(冀朝桢绘)