

- 其他各枚为长；花丝无毛 1. 雨久花属 *Monochoria* Presl
1. 花无梗；花被片两侧对称，合生，后方裂片具1异色斑点；雄蕊6枚，3长3短；至少长雄蕊的花丝有毛 2. 凤眼蓝属 *Eichhornia* Kunth

1. 雨久花属 *Monochoria* Presl

Presl, Rel. Haenk. 1: 128. 1827; Kunth, Enum. Pl. 4: 132. 1843;
Miq., Fl. Ind. Bat. 3: 548. 1859; Schwartz in Engl. et Prantl, Nat.
Pflanzenfam. ed. 2, 15a: 186. 1930. — *Gomphima* Rafin. Fl. Tellur.
2: 10. 1836.

多年生沼泽或水生草本，在不利的环境下为假一年生。茎直立或斜上，从根状茎发出。叶基生或单生于茎枝上，具长柄；叶片形状多变化，具弧状脉。花序排列成总状或近伞形状花序，从最上部的叶鞘内抽出，基部托以鞘状总苞片；花近无梗或具短梗；花被片6枚，深裂几达基部，白色、淡紫色或蓝色，中脉绿色，开花时展开，后来螺旋状扭曲，内轮3枚较宽；雄蕊6枚，着生于花被片的基部，较花被片短，其中有1枚较大，其花丝的一侧具斜伸的裂齿，花药较大，蓝色，其余5枚相等，具较小的黄色花药；花药基部着生，顶孔开裂，最后裂缝延长；子房3室，每室有胚珠多颗；花柱线形；柱头近全缘或微3裂。蒴果室背开裂成3瓣。种子小，多数。

本属约5种，分布于非洲东北部、亚洲东南部至澳大利亚南部。通常生长于池塘、沟渠、湖沼靠岸浅水处或稻田、水沟中。我国产3种。

分种检索表

1. 植株高大，高通常35—90厘米（稀更高）；叶片卵状心形，箭形或三角状卵形。
2. 叶片卵状心形或宽心形，基部裂片圆钝，长4—10厘米；花序有花10余朵
..... 1. 雨久花 *M. korsakowii* Regel et Maack
2. 叶片三角状卵形或箭形，基部裂片戟形或箭形，长7—15（—25）厘米；花序有花10—40朵
..... 2. 箭叶雨久花 *M. hastata* (Linn.) Solms
1. 植株矮小，高通常12—35厘米；叶片卵形至卵状披针形，长2—7厘米，宽0.8—5厘米，基部钝圆或浅心形；花序有花3—15朵 3. 鸭舌草 *M. vaginalis* (Burm. f.) Presl
1. 雨久花（秘传花镜） 图版32: 7—10

Monochoria korsakowii Regel et Maack in Mém. Acad. Pétersb. 4 (4): 155. 1861;
Hance in Journ. Linn. Soc. Bot. 13: 88. 1872; Franch., Pl. David. 1: 310. 1883;
N. E. Brown in Journ. Linn. Soc. Bot. 36: 149. 1903; 中国高等植物图鉴5: 405.
图7639. 1976.; 秦岭植物志1 (1): 296. 图266. 1976. — *M. ovata* Kunth, Enum. Pl.