

Krause in Engl. et Prantl, Natürlich Pflanzenfam. Aufl. 2,

15a, 260. 1930.

多年生草本;根状茎粗短,稍肉质。叶基生,莲座状,匙形、倒披针形至近条形,基部渐狭成柄。花葶从叶簇的侧面腋部抽出,上面生有几枚鞘状或苞片状叶;总状花序顶生,无苞片;花下垂,而后上举;花被片6,离生,宿存;雄蕊6,花药马蹄状,基着,药室汇合成一室,开裂后呈丫状或盾状;子房3裂,3室,胚珠多数;花柱生于子房顶端凹缺处,单一,长或短;柱头头状或叉状3裂。蒴果深3裂,三棱状。种子多数,细梭状,两端有长尾,全长4—5毫米。

共4种,主要产我国,缅甸也有分布。

分 种 检 索 表

1. 在花期,雄蕊与花柱多少伸出花被之外(比花被片长);柱头小头状,稍3裂;花梗长4—10毫米,通常比花被片稍长或近等长;3—4月份开花。
 2. 花梗和花被片各长6—10毫米;在花期,雄蕊和花柱明显伸出花被之外(雄蕊比花被片长约1/3);子房3深裂,分裂部分达全长的2/5—1/3(四川、湖南、广西)……………1. 丫蕊花 *Y. thibetica* Franch.
 2. 花梗和花被片各长4—6毫米;在花期,雄蕊和花柱仅稍伸出花被之外(雄蕊仅稍长于花被片);子房3浅裂,分裂部分约为全长的1/4—1/5(贵州、湖南、广西、广东)……………2. 小果丫蕊花 *Y. cavaleriei* Lévl. ex Vnt.
1. 在花期,雄蕊与花柱不伸出花被之外(比花被片短);柱头深3裂,裂片长0.5—0.8毫米,外弯;花梗长2—3(—4)毫米,短于花被片;6—7月份开花。
 3. 花柱短,长约1毫米,在果期常宿存于蒴果顶端凹缺之中;蒴果比宿存花被片长;花较小,花被片长4—5毫米,近匙形或倒披针形(云南、西藏)……………3. 云南丫蕊花 *Y. yunnanensis* W. W. Sm. et J. F. Jeffr.
 3. 花柱长,长2.5—4毫米,在果期明显高举于蒴果凹缺之上;蒴果比宿存的花被片短;花较大,花被片长7—12毫米,常为条状披针形(云南、西藏)……………4. 高山丫蕊花 *Y. alpinia* Wang et Tang

1. 丫蕊花 图4

Ypsilandra thibetica Franch., Pl. David. 2: 132, t. 17. 1888.—*Y. thibetica* Franch. var. *angustifolia* Wang et Tang, 静生生物所汇报 n. ser. 1: 106. 1943.

根状茎粗约1厘米,长1—5厘米。叶宽(0.6—)1.5—4.8厘米,连柄长6—27厘米。花葶通常比叶长,较少短于叶,长7—52厘米;总状花序具几朵至二十几朵花,花梗比花被稍长;花被片白色、淡红色至紫色,近匙状倒披针形,长6—10毫米,3—5脉;雄蕊长10—18毫米,至少有1/3伸出花被;子房上部3裂约达1/3—2/5,花柱长16—20毫米,稍高于雄蕊,在果期则明显高出雄蕊之上,柱头小,头状,稍3裂。蒴果长约为宿存的花被片的1/2—2/3。种子细梭状,两端有长尾,连尾长4—5毫米。花期3—4月,果期5—6月。

产四川中部至东南部(黑水、宝兴、天全、峨眉、雷波、合川、南川等)、湖南南部(雪峰山区)和广西东北部(全州县、临桂、兴安、龙胜等)。生于林下、路旁湿地或沟边,海拔1300—2850米。

2. 小果丫蕊花

Ypsilandra cavaleriei Lévl. et Vnt.
in Lévl., Liliac. etc. Chine 47. 1905.—
Y. parviflora Wang et Tang, 静生生物所汇报 n. ser. 1: 106. 1943.

体态近上种,植株大小的变化也比较大。但花较小,红色或白色;花梗与花被片各长4—6毫米;雄蕊与花柱较短,仅稍伸出花被外,只在果期明显伸长;子房上部浅3裂,约达全长的 $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{5}$ 。蒴果长约为花被片的 $\frac{2}{3}$ 。种子长约4毫米。花期3—4月,果期4—5月。

产贵州(中部至南部)、湖南南部(宜章)、广西(金秀)和广东西北部(乳源)。生于海拔1000—1400米的山坡或溪旁。



图4 丫蕊花 *Ypsilandra thibetica* Franch.
(冯晋庸绘)

3. 云南丫蕊花 图5

Ypsilandra yunnanensis W. W. Sm. et J. F. Jeffr. in Notes Bot. Gard. Edinb. 9: 143. 1916.
—*Y. yunnanensis* W. W. Sm. et J. F. Jeffr. var. *micrantha* Hand.-Mzt. in Sitzgsanz. Akad. W. W. 60: 155. 1923.

植株大小变化较大。叶连柄长2—13厘米,宽1—2厘米。花葶通常长于叶,长3—30(—40)厘米,总状花序较狭;花梗较短,长2—3毫米;花被片近匙形或倒披针形,长4—5毫米;雄蕊短于花被片,在果期可稍露出花被外;子房上部3浅裂,花柱短,长约1毫米,在果期不延长;柱头3裂,裂片长约0.8毫米,外弯。蒴果三棱状倒卵形,成熟时比花被片稍长,宽可达1厘米。种子长约5毫米。花期6—7月,果期8—10月。

产云南西北部(德钦、贡山等)和西藏(波密)。生于草坡、杜鹃林下或灌丛边缘,海拔3300—4000米。

4. 高山丫蕊花



图5 云南丫蕊花 *Ypsilandra yunnanensis* W. W. Sm. et J. F. Jeffr.
(冯晋庸绘)