

先端略破裂为带网眼的纤维网。叶在下部的数枚常近基生，狭长矩圆形或带状，长22—50厘米，宽1—3厘米，先端锐尖，基部无柄，两面无毛。圆锥花序塔状，长16—30(—50)厘米，疏生少数侧生总状花序，侧生总状花序轴粗壮；总轴和枝轴生短绵状毛；花多数，稍疏生，淡黄绿色带白色；花被片大，伸展，质地较厚，近倒卵状匙形或椭圆状倒卵形，长8—12毫米，宽4—6毫米，先端钝圆，基部明显具柄，全缘，在下部有两个(两团)明显可见的腺体；侧生花序上的花梗通常长超过1厘米，比小苞片长或近等长；子房无毛。蒴果直立，长1.5—2厘米，宽1厘米左右。花果期7—10月。

产贵州(东北部和西南部)和云南(东南部至西北部)。生于海拔1200—3300米的山坡路旁或林下。

本种的特点是花大，质地较厚，花被片倒卵状匙形，具明显可见的腺体，基部有柄，故易于识别。根药用，除具有一般藜芦共有的功效外，而对于跌打损伤，治疗骨折、截瘫、癫痫有效，但有大毒，注意用量。

13. 大理藜芦

Veratrum taliense Loes. f. in Verh. Bot. Ver. Brand. 68: 145. 1926; et in Rep. Sp. Nov. Fedde 25: 5. 1928.——*V. cavaleriei* Loes. f., l. c., p. 143.

本种很近上一种，但圆锥花序长而扩展，长达85厘米，疏生多数长12—16厘米的侧生总状花序，侧生总状花序较细长，有时曲折状，顶生总状花序通常长40厘米以上；花质地较薄，花被片矩圆形，先端稍尖，基部近无柄，无明显可见的腺体。花果期10—11月。

产云南(西北部至东南部)和四川(西南部)。生于海拔2400米左右的山坡草地上。根药用，与蒙自藜芦同。

5. 油点草族——Tricyrteae

只1属。特征见属的描述。

8. 油点草属——*Tricyrtis* Wall.

Wall., Tent. Fl. Nepal. 2: 61, t. 46. 1826.

多年生草本；根状茎短或稍长，横走。茎直立，圆柱形，有时分枝。叶互生于整个茎上，卵形、矩圆形至椭圆形，近无柄，抱茎。花单生或簇生，常排成顶生和生于上部叶腋的二歧聚伞花序；花被片6，离生，绿白色、黄绿色或淡紫色，开放前钟状，开放后花被片直立、斜展或反折，通常早落，外轮三片在基部囊状或具短距；雄蕊6枚，花丝扁平，下部常多少靠合成筒；花药矩圆形，背着，2室，外向开裂；柱头3裂，向外弯垂，裂片上端又二深裂，密生腺毛；子房3室，胚珠多数。蒴果直立或点垂，狭矩圆形，具三棱，上部室间开裂。种子小而扁，卵形至圆形。

约15种，分布于亚洲东部，从不丹、锡金至日本。我国有4种，产于华北和秦岭以南

各省区。

分 种 检 索 表

1. 茎下部的叶卵状椭圆形或矩圆形,基部心形或圆形,抱茎或半抱茎;花绿白色或黄绿色。
 2. 花完全开放后,花被片自中下部向外反折(浙江、江西、福建、安徽、江苏、湖北、湖南、广东、广西、贵州) 1. 油点草 *T. macropoda* Miq.
 2. 花完全开放后,花被片向上斜展或近水平伸展(西南、陕西、甘肃、河北、河南、湖南、湖北) 2. 黄花油点草 *T. maculata* (D. Don) Machride
1. 茎下部的叶狭椭圆形或倒披针形,基部收狭而多少呈楔形,短柄状;花淡紫色。
 3. 茎下部的叶狭椭圆形;花被片内面的紫斑不明显;子房无毛(台湾) 3. 台湾油点草 *T. formosana* Baker
 3. 茎下部的叶倒披针形;花被片内面的紫斑明显;子房生有长柔毛(台湾) 4. 紫花油点草 *T. stolonifera* Matsumura

1. 油点草 图版 6: 1—2

Tricyrtis macropoda Miq. in Vers. Med. Akad. Amsterdam Ser. 2, 2: 86. 1868.

植株高可达 1 米。茎上部疏生或密生短的糙毛。叶卵状椭圆形、矩圆形至矩圆状披针形,长(6—)8—16(—19)厘米,宽(4—)6—9(—10)厘米,先端渐尖或急尖,两面疏生短糙伏毛,基部心形抱茎或圆形而近无柄,边缘具短糙毛。二歧聚伞花序顶生或生于上部叶腋,花序轴和花梗生有淡褐色短糙毛,并间生有细腺毛;花梗长 1.4—2.5(—3)厘米;苞片很小;花疏散;花被片绿白色或白色,内面具多数紫红色斑点,卵状椭圆形至披针形,长约 1.5—2 厘米,开放后自中下部向下反折;外轮 3 片较内轮为宽,在基部向下延伸而呈囊状;雄蕊约等长于花被片,花丝中上部向外弯垂,具紫色斑点;柱头稍微高出雄蕊或有时近等高,3 裂;裂片长 1—1.5 厘米,每裂片上端又二深裂,小裂片长约 5 毫米,密生腺毛。蒴果直立,长约 2—3 厘米。 花果期 6—10 月。

产浙江、江西、福建、安徽、江苏(宜兴、溧阳)、湖北(建始)、湖南、广东、广西和贵州(东南部)。生于海拔 800—2400 米的山地林下、草丛中或岩石缝隙中。日本也有。

2. 黄花油点草 图版 6: 3

Tricyrtis maculata (D. Don) Machride in Contr. Gray Herb. n. s. 53: 5. 1918. — *Compsos maculata* D. Don, Prodr. Fl. Nepal. 51. 1825. — *T. pilosa* Wall., Tent. Fl. Nepal. 2: 62. 1826. — *T. puberula* Nakai et Kitag. in Rep. First Sc. Exped. Manchouk. 4, 1: 19. 1934. — *T. bakerii* Koidz. in Bot. Mag. Tokyo, 38: 103. 1924; 中国高等植物图鉴 5: 429, 图 7688. 1976. — *T. macropoda* auct. non Miq.; Baker in Bot. Mag. t. 6544. 1881.

植株的体态和花的结构与上种极相似,但花通常黄绿色;花被片向上斜展或近水平伸