

近披针形,长8—60厘米,宽0.6—2(—5)厘米,基部有时收缩成柄状。花葶单个,通常比叶长;花白色,单生或2—3朵簇生,通常排成疏离的总状花序,较少具侧枝而成圆锥花序;花梗长约1厘米,关节通常位于近中部或上部;花被片长10—13毫米;雄蕊稍短于花被片;花药通常长约为花丝的一倍,较少近等长。蒴果三棱状,一般倒卵形,较少近球形,长约6—9毫米,每室具6—9颗种子。花果期7—9月。

产西藏南部(吉隆、聂拉木、错那)、云南西部至西北部(保山、洱源、鹤庆、丽江、中甸)、贵州西部和四川西南部(布拖、木里)。生于林缘、草坡或山谷岩石上,海拔1300—2750米。也分布于尼泊尔、锡金和印度。

本种有两种类型。一类叶较宽,基部渐狭成较明显的柄,蒴果近三棱状球形,长宽相等或较宽。另一类叶较狭,基部无明显的柄,蒴果三棱状倒卵形,长于宽。但这种相关特征有交叉和过渡,而且同一果序上的蒴果形状也有变化,所以我们暂予归并成一种。

3. 狭叶吊兰 图版10: 6—7

Chlorophytum chinense Bur. et Franch. in Journ. de Bot. 5: 154. 1891.
—*C. platystemon* Diels in Notes Bot. Gard. Edinb. 5: 299. 1912.

根状茎不明显;根肥厚,近纺锤状或圆柱状,粗2—3毫米。叶禾状,长8—30厘米,宽2—5毫米。花葶比叶长;花单生,白色,带淡红色脉,排成总状花序或圆锥花序;花梗长7—11毫米,关节通常位于下部;花被片与花梗近等长,3—5脉聚生于中央;雄蕊稍短于花被片,花药常多少粘合,长约为花丝的一倍多。花期6—8月。

产云南西北部(丽江、中甸)和四川西南部(康定、稻城、木里、巴塘)。生于海拔2600—3000米的林缘、草坡或河边。

4. 大叶吊兰

Chlorophytum malayense Ridley, Fl. Malay Penins. 5: 341. 1925; Panigrahi in Kew Bull. 30: 565. 1975.—*C. orchidastrum* auct. non Ldl.; Ridley, l. c. 4: 327. 1924; Gagnep. in Fl. Gener. Indo-Chine 6: 806. 1936.

根状茎粗而长,近直生,直径1—2厘米,节上散生有具绵毛的根。叶狭矩圆状披针形或披针形,宽2—5厘米,基部渐狭成长柄,连柄长50—70厘米,干后常变黑色。花葶稍长于叶或近等长;花白色,通常每2朵着生(较少1或3朵的),排成圆锥花序。圆锥花序有时具较多的分枝;花梗长3—5毫米,关节位于近中部;花被片长8—10毫米;雄蕊短于花被片;花药长约3—4毫米,比花丝稍长。蒴果三棱状球形,长6—7毫米,宽7—9毫米,每室具4颗种子。花果期4—5月。

产云南南部(西双版纳和澜沧)。生于海拔1100—1450米的林下、灌丛或峡谷中。也分布于老挝、越南、泰国和马来西亚。

据 Panigrahi 的研究,原来广布于非洲至亚洲的种 *C. orchidastrum* Ldl. 在外部形态和染色体数目上均存在不同的类型。他把此种分成4个种。本种染色体 $2n=56$ 。

我们的标本,有粗长的根状茎(原描述及《印度支那植物志》中均未见根状茎的记载),但其他特征均相符。我们采用 Panigrahi 的观点。

5. 小花吊兰 疏花吊兰,三角草 图版 10: 4—5

Chlorophytum laxum R. Br., Prodr. 277. 1810; 中国高等植物图鉴 5: 432, 图 7693. 1976.——*Anthericum parviflorum* Benth., Fl. Hongk. 373. 1861.

叶近两列着生,禾叶状,常弧曲,长 10—20 厘米,宽 3—5 毫米。花葶从叶腋抽出,常 2—3 个,直立或弯曲,纤细,有时分叉,长短变化较大;花梗长 2—5 毫米,关节位于下部;花单生或成对着生,绿白色,很小;花被片长约 2 毫米;雄蕊短于花被片;花药矩圆形,长约 0.3 毫米;花丝比花药长 2—3 倍。蒴果三棱状扁球形,长约 3 毫米,宽约 5 毫米,每室通常具单颗种子。花果期 10 月至次年 4 月。

产广东南部(云浮、东平、高要、徐闻和海南岛)。生于低海拔地区山坡荫蔽处或岩石边。广布于非洲和亚洲的热带、亚热带地区。

有毒植物。治毒蛇咬伤,跌打肿痛。用鲜品捣烂敷患处。

13. 鹭鸶草属——*Diurathera* Hemsl.

Hemsl. in Hook. Ic. Pl. 8: t. 2734. 1902.

多年生草本;根状茎较短。叶基生,条形或舌状,草质而稍带肉质。花葶从叶丛中央抽出,通常不分枝或较少分枝,下面有 1—2 枚苞片状叶,向上渐小,逐渐过渡为苞片;总状花序或圆锥花序具稀疏的花;花白色,常 2(—3) 朵簇生,具短梗;花梗具或不具关节;花被片 6, 离生,具 3—5 脉,相似,但外轮 3 片稍窄于内轮 3 片,常外弯;雄蕊 6, 稍短于花被片;花丝丝状,花药在近基部的背面着生,较长,多少弧曲,基部有 2 个平行的尾状附属物;子房 3 室,每室有多数胚珠(通常为 7—12 枚)。蒴果三棱形,每室有种子 2—5 枚。种子黑色,圆形,压扁,基部有 2 小耳。

共 3 种,分布于我国西南各省,为我国特有属。

分 种 检 索 表

1. 花梗上无关节;花被片外轮具 5 条脉,内轮具 3 条脉(四川).....
..... 1. 南川鹭鸶草 *D. inarticulata* Wang et K. Y. Lang
1. 花梗上具 1 明显的关节;内、外轮花被片或均具 3 条脉,或均具 5 条脉。
 2. 叶较宽,宽 1.3—3.2 厘米;内、外轮花被片均具 3 条脉;花药长 13 毫米,基部的尾状附属物长 2.5—3 毫米,先端极锐尖(四川、云南、贵州).....2. 鹭鸶草 *D. major* Hemsl.
 2. 叶较窄,通常宽 0.7—1.1 厘米,较少达 1.8 厘米;内、外轮花被片均具 5 条脉;花药长 8 毫米,基部的尾状附属物长 1.2—1.5 毫米,先端钝圆,向上钩起(四川、云南、贵州).....
.....3. 小鹭鸶草 *D. minor* (C. H. Wright) Hemsl.