

我们的标本,有粗长的根状茎(原描述及《印度支那植物志》中均未见根状茎的记载),但其他特征均相符。我们采用 Panigrahi 的观点。

5. 小花吊兰 疏花吊兰,三角草 图版 10: 4—5

Chlorophytum laxum R. Br., Prodr. 277. 1810; 中国高等植物图鉴 5: 432, 图 7693. 1976.——*Anthericum parviflorum* Benth., Fl. Hongk. 373. 1861.

叶近两列着生,禾叶状,常弧曲,长 10—20 厘米,宽 3—5 毫米。花葶从叶腋抽出,常 2—3 个,直立或弯曲,纤细,有时分叉,长短变化较大;花梗长 2—5 毫米,关节位于下部;花单生或成对着生,绿白色,很小;花被片长约 2 毫米;雄蕊短于花被片;花药矩圆形,长约 0.3 毫米;花丝比花药长 2—3 倍。蒴果三棱状扁球形,长约 3 毫米,宽约 5 毫米,每室通常具单颗种子。花果期 10 月至次年 4 月。

产广东南部(云浮、东平、高要、徐闻和海南岛)。生于低海拔地区山坡荫蔽处或岩石边。广布于非洲和亚洲的热带、亚热带地区。

有毒植物。治毒蛇咬伤,跌打肿痛。用鲜品捣烂敷患处。

13. 鹭鸶草属——*Diurathera* Hemsl.

Hemsl. in Hook. Ic. Pl. 8: t. 2734. 1902.

多年生草本;根状茎较短。叶基生,条形或舌状,草质而稍带肉质。花葶从叶丛中央抽出,通常不分枝或较少分枝,下面有 1—2 枚苞片状叶,向上渐小,逐渐过渡为苞片;总状花序或圆锥花序具稀疏的花;花白色,常 2(—3) 朵簇生,具短梗;花梗具或不具关节;花被片 6, 离生,具 3—5 脉,相似,但外轮 3 片稍窄于内轮 3 片,常外弯;雄蕊 6, 稍短于花被片;花丝丝状,花药在近基部的背面着生,较长,多少弧曲,基部有 2 个平行的尾状附属物;子房 3 室,每室有多数胚珠(通常为 7—12 枚)。蒴果三棱形,每室有种子 2—5 枚。种子黑色,圆形,压扁,基部有 2 小耳。

共 3 种,分布于我国西南各省,为我国特有属。

分种检索表

1. 花梗上无关节;花被片外轮具 5 条脉,内轮具 3 条脉(四川).....
..... 1. 南川鹭鸶草 *D. inarticulata* Wang et K. Y. Lang
1. 花梗上具 1 明显的关节;内、外轮花被片或均具 3 条脉,或均具 5 条脉。
 2. 叶较宽,宽 1.3—3.2 厘米;内、外轮花被片均具 3 条脉;花药长 13 毫米,基部的尾状附属物长 2.5—3 毫米,先端极锐尖(四川、云南、贵州).....2. 鹭鸶草 *D. major* Hemsl.
 2. 叶较窄,通常宽 0.7—1.1 厘米,较少达 1.8 厘米;内、外轮花被片均具 5 条脉;花药长 8 毫米,基部的尾状附属物长 1.2—1.5 毫米,先端钝圆,向上钩起(四川、云南、贵州).....
.....3. 小鹭鸶草 *D. minor* (C. H. Wright) Hemsl.