

根状茎粗厚,粗 1.5—3 厘米。叶卵状心形、卵形或卵圆形,长 14—24 厘米,宽 8—16 厘米,先端近渐尖,基部心形,具 6—10 对侧脉;叶柄长 20—40 厘米。花葶高 40—80 厘米,具几朵至十几朵花;花的外苞片卵形或披针形,长 2.5—7 厘米,宽 1—1.5 厘米;内苞片很小;花单生或 2—3 朵簇生,长 10—13 厘米,白色,芳香;花梗长约 1 厘米;雄蕊与花被近等长或略短,基部约 15—20 毫米贴生于花被管上。蒴果圆柱状,有三棱,长约 6 厘米,直径约 1 厘米。 花果期 8—10 月。

产四川(峨眉山至川东)、湖北、湖南、江苏、安徽、浙江、福建和广东。生于海拔 2200 米以下的林下、草坡或岩石边。各地常见栽培,公园尤多,供观赏。

全草供药用。花清咽、利尿、通经,亦可供蔬食或作甜菜,但须去掉雄蕊。根、叶有小毒,外用治乳腺炎、中耳炎、疮痈肿毒、溃疡等。

2. 紫萼 图版 12: 1—3

Hosta ventricosa (Salisb.) Stearn in Gard. Chron. ser. 3, 90: 27 et 48. 1931.——*Bryocles ventricosa* Salisb. in Trans. Hort. Soc. 1: 335. 1812.——*Hosta coerulea* Tratt. in Arch. Gewächsk. 2: 144. 1814, non Jacq. (1797).——*Funkia ovata* Spreng., Syst. 2: 40. 1825.——? *F. argyi* Lévl., Nouv. Contrib. Liliac. etc. Chine 16. 1906.——*F. legendrei* Lévl. in Rep. Sp. Nov. Fedde 7: 339. 1909.

根状茎粗 0.3—1 厘米。叶卵状心形、卵形至卵圆形,长 8—19 厘米,宽 4—17 厘米,先端通常近短尾状或骤尖,基部心形或近截形,极少叶片基部下延而略呈楔形,具 7—11 对侧脉;叶柄长 6—30 厘米。花葶高 60—100 厘米,具 10—30 朵花;苞片矩圆状披针形,长 1—2 厘米,白色,膜质;花单生,长 4—5.8 厘米,盛开时从花被管向上骤然作近漏斗状扩大,紫红色;花梗长 7—10 毫米;雄蕊伸出花被之外,完全离生。蒴果圆柱状,有三棱,长 2.5—4.5 厘米,直径 6—7 毫米。 花期 6—7 月,果期 7—9 月。

产江苏(南部)、安徽、浙江、福建(北部)、江西、广东(北部)、广西(北部)、贵州、云南(宾川、大理)、四川、湖北、湖南和陕西(秦岭以南)。生于林下、草坡或路旁,海拔 500—2400 米。

各地常见栽培,供观赏。内用治胃痛、跌打损伤,外用治虫蛇咬伤和痈肿疔疮。

据 C. H. Wright (Journ. Linn. Soc. Bot. 36: 117. 1903.) 报告, *H. minor* (Baker) Nakai 和 *H. sieboldiana* (Lodd.) Engl. (均放在 *Funkia* 之内) 也见于我国。他所根据的标本我们未看到,但从有关地区的标本看,可能就是本种。有些标本虽然叶柄上部具狭翅(即叶片下延),但同一植株上有变化,存在许多过渡类型,所以我们仍视为本种。

3. 东北玉簪 图版 12: 5—6

Hosta ensata F. Maekawa in Journ. Jap. Bot. 13: 900. 1937; 刘慎谔等,



1—3. 紫萼 *Hosta ventricosa* (Salisb.) Stearn: 1. 植株下部, 2. 花序, 3. 花, 已剖开; 4. 玉簪 *H. plantaginea* (Lam.) Aschers.: 花序; 5—6. 东北玉簪 *H. ensata* P. Mackawa: 5. 叶, 6. 花。(张泰利、张春芳绘)

东北植物检索表 576, 图版 216, 图 11. 1959.——*H. clause* Nakai var. *normalis* F. Maekawa, l. c., p. 899.——*H. lancifolia* auct. non Spreng.; Czerniak. in Kom., Fl. URSS 4: 55, t. 5, f. 2. 1935.

根状茎粗约 1 厘米, 有长的走茎。叶矩圆状披针形、狭椭圆形至卵状椭圆形, 长 10—15 厘米, 宽 2—6(—7) 厘米, 先端近渐尖, 基部楔形或钝, 具 5—8 对侧脉; 叶柄长 5—26 厘米, 由于叶片下延而至少上部具狭翅, 翅每侧宽 2—5 毫米。花葶高 33—55 厘米, 具几朵至二十几朵花, 苞片近宽披针形, 长 5—7 毫米, 膜质; 花单生, 长 4—4.5 厘米, 盛开时从花被管向上逐渐扩大, 紫色; 花梗长 5—10 毫米; 雄蕊稍伸出花被之外, 完全离生。花期 8 月。

产吉林南部(延边、抚松、通化)和辽宁南部(桓仁、辽阳)。生于海拔 420 米的林边或湿地上。也分布于朝鲜和苏联。

4. 紫玉簪

Hosta albo-marginata (Hook.) Ohwi in Act. Phytotax. et Geobot. 11: 265. 1942.——*Funkia albo-marginata* Hook. in Bot. Mag. t. 3657. 1839.——*Aletris japonica* Thunb. in Nov. Act. Reg. Soc. Sci. Ups. 3: 204 et 208. 1780.——*Hemerocallis japonica* Thunb., Fl. Jap. 142. 1784, non 1794.——*H. lancifolia* Thunb. in Trans. Linn. Soc. 2: 335. 1794, nom. superf.——*Funkia lancifolia* Spreng., Syst. 2: 41. 1825.——*Hosta lancifolia* (Thunb.) Engl. in Nat. Pflanzenf. 2, 5: 40. 1888.

叶狭椭圆形或卵状椭圆形, 长 6—13 厘米, 宽 2—6 厘米, 先端渐尖或急尖, 基部钝圆或近楔形, 具 4—5 对侧脉; 叶柄长 10—22 厘米, 最上部由于叶片稍下延而多少具狭翅, 翅每侧宽 1—2 毫米。花葶高 33—60 厘米, 具几朵至十几朵花, 苞片近宽披针形, 长 7—10 毫米, 膜质; 花单生, 长约 4 厘米, 盛开时从花被管向上逐渐扩大, 紫色; 雄蕊稍伸出花被管之外, 完全离生。花期 8—9 月。

原产日本, 有叶子具白边和不具白边的品种。我国北京和江西有栽培。

据 F. Maekawa 记载, *H. cathayana* Nakai 南京有栽培, 但我们未见到标本。

16. 萱草属——*Hemerocallis* L.

L., Sp. Pl. ed. 1, 324. 1753; et Gen. Pl. ed. 5, 151. 1754;
Stout, Daylilies, 1—119. 1934; Steward in Herbertia 6: 168.
1939; S. Y. Hu in Amer. Hort. Mag. 47(2): 85. 1968.

多年生草本, 具很短的根状茎; 根常多少肉质, 中下部有时有纺锤状膨大。叶基生, 二列, 带状。花葶从叶丛中央抽出, 顶端具总状或假二歧状的圆锥花序, 较少花序缩短或只具单花; 苞片存在, 花梗一般较短; 花直立或平展, 近漏斗状, 下部具花被管; 花被裂片 6,