

东北植物检索表 576, 图版 216, 图 11. 1959.——*H. clause* Nakai var. *normalis* F. Maekawa, l. c., p. 899.——*H. lancifolia* auct. non Spreng.; Czerniak. in Kom., Fl. URSS 4: 55, t. 5, f. 2. 1935.

根状茎粗约 1 厘米, 有长的走茎。叶矩圆状披针形、狭椭圆形至卵状椭圆形, 长 10—15 厘米, 宽 2—6(—7) 厘米, 先端近渐尖, 基部楔形或钝, 具 5—8 对侧脉; 叶柄长 5—26 厘米, 由于叶片下延而至少上部具狭翅, 翅每侧宽 2—5 毫米。花葶高 33—55 厘米, 具几朵至二十几朵花, 苞片近宽披针形, 长 5—7 毫米, 膜质; 花单生, 长 4—4.5 厘米, 盛开时从花被管向上逐渐扩大, 紫色; 花梗长 5—10 毫米; 雄蕊稍伸出花被之外, 完全离生。花期 8 月。

产吉林南部(延边、抚松、通化)和辽宁南部(桓仁、辽阳)。生于海拔 420 米的林边或湿地上。也分布于朝鲜和苏联。

4. 紫玉簪

Hosta albo-marginata (Hook.) Ohwi in Act. Phytotax. et Geobot. 11: 265. 1942.——*Funkia albo-marginata* Hook. in Bot. Mag. t. 3657. 1839.——*Aletris japonica* Thunb. in Nov. Act. Reg. Soc. Sci. Ups. 3: 204 et 208. 1780.——*Hemerocallis japonica* Thunb., Fl. Jap. 142. 1784, non 1794.——*H. lancifolia* Thunb. in Trans. Linn. Soc. 2: 335. 1794, nom. superf.——*Funkia lancifolia* Spreng., Syst. 2: 41. 1825.——*Hosta lancifolia* (Thunb.) Engl. in Nat. Pflanzenf. 2, 5: 40. 1888.

叶狭椭圆形或卵状椭圆形, 长 6—13 厘米, 宽 2—6 厘米, 先端渐尖或急尖, 基部钝圆或近楔形, 具 4—5 对侧脉; 叶柄长 10—22 厘米, 最上部由于叶片稍下延而多少具狭翅, 翅每侧宽 1—2 毫米。花葶高 33—60 厘米, 具几朵至十几朵花, 苞片近宽披针形, 长 7—10 毫米, 膜质; 花单生, 长约 4 厘米, 盛开时从花被管向上逐渐扩大, 紫色; 雄蕊稍伸出花被管之外, 完全离生。花期 8—9 月。

原产日本, 有叶子具白边和不具白边的品种。我国北京和江西有栽培。

据 F. Maekawa 记载, *H. cathayana* Nakai 南京有栽培, 但我们未见到标本。

16. 萱草属——*Hemerocallis* L.

L., Sp. Pl. ed. 1, 324. 1753; et Gen. Pl. ed. 5, 151. 1754;

Stout, Daylilies, 1—119. 1934; Steward in Herbertia 6: 168.

1939; S. Y. Hu in Amer. Hort. Mag. 47(2): 85. 1968.

多年生草本, 具很短的根状茎; 根常多少肉质, 中下部有时有纺锤状膨大。叶基生, 二列, 带状。花葶从叶丛中央抽出, 顶端具总状或假二歧状的圆锥花序, 较少花序缩短或只具单花; 苞片存在, 花梗一般较短; 花直立或平展, 近漏斗状, 下部具花被管; 花被裂片 6,